

<b>Nom du document : Facteur VIII</b>	<b>Identifiant :</b> 38-BS-DOC-124564 <b>Version : 01</b>
<b>Autorité responsable :</b> Dr Douglas Fish, hématologue	<b>Date d'entrée en vigueur :</b> 2020-07-02

<b>Technique d'administration</b>	<b>Classe : Produit sanguin stable</b>																					
<b>Nom : Zonovate</b>																						
<b>Indication (réf : Monographie – Février 2020) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement et prophylaxie des hémorragies associées à un déficit congénital en facteur VIII (hémophilie A).</li> </ul>																						
<b>Reconstitution :</b>																						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Zonovate</th> <th>Chlorure de sodium</th> <th>Conc. finale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 UI/fiole</td> <td>4 ml</td> <td>62.5 UI/ml</td> </tr> <tr> <td>500 UI/fiole</td> <td>4 ml</td> <td>125 UI/ml</td> </tr> <tr> <td>1000 UI/fiole</td> <td>4 ml</td> <td>250 UI/ml</td> </tr> <tr> <td>1500 UI/fiole</td> <td>4 ml</td> <td>375 UI/ml</td> </tr> <tr> <td>2000 UI/fiole</td> <td>4 ml</td> <td>500 UI/ml</td> </tr> <tr> <td>3000 UI/fiole</td> <td>4 ml</td> <td>750 UI/ml</td> </tr> </tbody> </table>		Zonovate	Chlorure de sodium	Conc. finale	250 UI/fiole	4 ml	62.5 UI/ml	500 UI/fiole	4 ml	125 UI/ml	1000 UI/fiole	4 ml	250 UI/ml	1500 UI/fiole	4 ml	375 UI/ml	2000 UI/fiole	4 ml	500 UI/ml	3000 UI/fiole	4 ml	750 UI/ml
Zonovate	Chlorure de sodium	Conc. finale																				
250 UI/fiole	4 ml	62.5 UI/ml																				
500 UI/fiole	4 ml	125 UI/ml																				
1000 UI/fiole	4 ml	250 UI/ml																				
1500 UI/fiole	4 ml	375 UI/ml																				
2000 UI/fiole	4 ml	500 UI/ml																				
3000 UI/fiole	4 ml	750 UI/ml																				
<b>Préparation pour injection IV :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les instructions de la reconstitution avec le système MixPro (voir Monographie du produit).</li> </ul>																						
<b>Posologie et fréquence d'administration :</b> Dose initiale recommandée : poids corporel en kg X élévation souhaitée du taux de FVIII à atteindre X 0.5 UI/kg (dose typique adulte 70 kg = 1500-3500 UI). Fréquence : toutes les 8 à 24 heures ou selon l'ordonnance.																						
<b>Durée de conservation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seringue : administrer immédiatement.</li> </ul>	<b>Compatibilité :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zonovate : donner seul.</li> <li>Soluté : NaCl 0.9%.</li> </ul>																					
<b>Vitesse d'administration :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IV direct de 1 à 2 minutes/minute (débit soluté primaire &gt; 40 ml/heure).</li> </ul>																						
<b>Effets indésirables possibles :</b> Réactions au point d'injection, élévation des enzymes hépatiques, fatigue, céphalées, étourdissement, tachycardie, hypertension, éruptions cutanées, fièvre, raideur et douleurs musculaires, enflure des MI.																						

**LOCALISATION DES COPIES PAPIER:**  
Cartable des documents de laboratoire Produits sanguins