

1.31 – ORDONNANCE COLLECTIVE

Dépistage de la diarrhée associée aux Clostridioides difficiles (DACD) et mesures d'isolement

I- PROFESSIONNELS VISÉS

Les infirmières de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM)

II - CLIENTÈLE VISÉE

Les patients de l'ICM

III – INDICATIONS DE DÉPISTAGE

- Présence de 3 selles liquides ou molles (qui épousent la forme d'un contenant) en 24 h ET présence **d'au moins un** des facteurs de risque
- Chez les personnes porteuses d'une stomie, augmentation de la quantité de selles et de la fréquence de changement de sac collecteur en 24 h ET présence **d'au moins un** des facteurs de risque
- Si premier résultat négatif et persistance de selles liquides ou molles, refaire le dépistage C. difficile après 48 h
- Facteurs de risque :
 - Toute antibiothérapie dans les 12 dernières semaines
 - Histoire antérieure de DACD
 - Contact étroit avec une personne ayant développé des DACD
 - Hospitalisation en centre hospitalier de soins aigus dans les 12 dernières semaines

IV - INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Identifier rapidement les cas de Clostridioides difficile

V – CONTRE-INDICATIONS

- Selles formées
- Traitement antibiotiques pour Clostridioides difficile en cours (vancomycine PO, metronidazole IV ou PO, fidaxomicine PO)

VI – PROCÉDURE

- Se référer à la technique de soins 9.17 - Prélèvement de selles pour la recherche de la toxine C. Difficile
- Aviser l'assistante infirmière-chef (AIC) à la deuxième selle liquide ou molle
- Procéder au prélèvement à la 3^{ième} selle liquide ou molle (10 à 20 mL) dans un contenant stérile
- Acheminer le spécimen dans un sac fermé au laboratoire dans les 30 minutes suivant le prélèvement. Si plus de 30 minutes à la température de la pièce, la toxine ne pourra pas être détectée.
- S'assurer d'identifier « recherche de toxine » dans Softlab

VII – INDICATION D'ISOLEMENT

- Isoler le patient à la 3^{ième} selle liquide ou molle en 24 h, ou lorsqu'il y a augmentation de la quantité de selles et de la fréquence de changement du sac collecteur en 24 h chez les personnes porteuses de stomies
- Appliquer l'isolement de type « contact + »
- Si résultat positif : aviser le médecin pour débuter un traitement
- Si présence d'un 2^{ième} test négatif et présence de symptômes : maintenir l'isolement jusqu'à l'avis de la prévention et contrôle des infections