

1.46 – ORDONNANCE COLLECTIVE

Administration de Lidocaïne 2 % sans épinéphrine pour le cathéter intra-osseux EZ-IO

L'installation d'un cathéter intra-osseux EZ-IO demande une ordonnance individuelle.

I. PROFESSIONNEL VISÉS

Les infirmières de l'urgence ayant eu la formation.

II. CLIENTÈLE VISÉE

Les patients qui nécessitent l'installation d'un cathéter intra-osseux EZ-IO.

III. INDICATIONS

Les patients à l'Institut de cardiologie de Montréal chez qui l'accès veineux (périphérique ou central) retarde, dans un délai raisonnable, le début de la thérapie intraveineuse requise.

IV. CONTRE-INDICATIONS

Se référer à la technique de soins 14.11.

V. PROCÉDURE

Suivre les étapes d'administration selon la technique de soins 14.11 (section procédure)

Administrer dans l'ordre si le patient est conscient :

- Lidocaïne 2 % (Xylocaïne^{MD}) **SANS** épinéphrine et SANS agent de conservation 40 mg (2 mL) intra-osseux X 1 dose pour effectuer le vide de la tubulure. Administrer en 2 minutes puis attendre 1 minute avant l'étape suivante.
- NaCl 0,9 % 10 mL intra-osseux rapidement pour procéder à la vidange du cathéter intra-osseux
- Lidocaïne 2 % (Xylocaïne^{MD}) **SANS** épinéphrine et SANS agent de conservation 20 mg (1 mL) intra-osseux X 1 dose après la purge. Administrer en 1 minute.

Se référer à la technique de soins *Assistance à l'installation d'un cathéter intra-osseux EZ-IO* (14.11) et à la règle de soins *Installation et retrait du cathéter intra-osseux par les infirmières de l'Institut de cardiologie de Montréal* (14).