

**2.125 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
PRÉMÉDICATION DES PATIENTS
ALLERGIQUES AUX PRODUITS DE CONTRASTE -
PATIENT HOSPITALISÉ**

I. HISTORIQUE DE L'ALLERGIE

Complétez les informations suivantes si connues :

Nom de l'agent de contraste : _____

Type d'examen et lieu de la réaction : _____


Type de réaction : _____

Date de la réaction : _____

II. ALGORITHME DÉCISIONNEL

Examen prévu : _____

Évaluez l'indication de prémédication selon l'algorithme suivant : _____



III. PROTOCOLE DE PRÉMÉDICATION

- Protocole en cas de situation **non urgente** (privilégier) :
 - Prednisone 50 mg PO à 21 h la veille de la procédure (1^{ère} dose)
 - Prednisone 50 mg PO à 6 h le matin (2^e dose)
 - Si l'examen est reporté à plus tard la même journée, la dose de prednisone PO 50 mg doit être répétée q 6 h jusqu'au moment de l'examen
 - Si l'examen est reporté à une autre journée, répéter le protocole à partir de la 1^{ère} dose
- Protocole en cas de situation **urgente** (procédure dans < 12 h) :
 - Hydrocortisone 250 mg IV en 2 minutes
 - Diphenhydramine 50 mg IV en 2 minutes
 } Administrer consécutivement, dans les 60 min avant la procédure
- Prémédication non requise

Signature du prescripteur : _____ Date : _____ Heure : _____

**2.125 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
PRÉMÉDICATION DES PATIENTS
ALLERGIQUES AUX PRODUITS DE CONTRASTE -
PATIENT HOSPITALISÉ**

IV. OUTILS D'ÉVALUATION DES RÉACTIONS ALLERGIQUES

Nom des produits de contraste utilisés pendant les examens (il n'y a pas de réaction croisée entre ces 3 types) :

1. Produits de contraste iodé pour les procédures d'angiographie ou de tomodensitométrie (scan) :
 - Iodixanol (*Visipaque^{MD}*)
 - Iopamidol (*Isovue^{MD}*)
 - Iohexol (*Omnipaque^{MD}*)

2. Produits de contraste à base de gadolinium pour les procédures d'imagerie par résonance magnétique (IRM) :
 - Gadobutrol (*Gadovist^{MD}*)
 - Gadobénate Diméglutine (*MultiHance^{MD}*)
 - Gadotéridol (*ProHance^{MD}*)

3. Produits de contraste pour les procédures d'échographie :
 - Perflurène (*Definity^{MD}*)
 - Hexafluorure de soufre (*Sonovue^{MD}*)

} Ne jamais prémédiquer

EXEMPLES DE RÉACTIONS AUX PRODUITS DE CONTRASTE	
Allergique	Non allergique²
Urticaire/prurit	Insuffisance rénale
Œdème cutané	Céphalées/étourdissements/anxiété
Hypotension	Nausées/vomissements
Angioedème sans dyspnée	
Angioedème avec dyspnée ¹	
Bronchospasme ¹	
Choc anaphylactique ¹	
Autre réaction menaçant la vie ¹	

¹Réaction sévère. Consultation en radiologie pour considérer un examen sans contraste ou changer de produit de contraste.

²Les patients avec un antécédent d'effet secondaire non-allergique ne doivent pas recevoir de prémédication

V. SUIVI À EFFECTUER APRÈS L'EXPOSITION AU PRODUIT DE CONTRASTE

- Suivi des signes vitaux (pression artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène) et de l'état général du patient q 1 h x 4 puis q 4 h x 24 h
- Glycémie des patients diabétiques q 4 h x 24 h
- Suivi quotidien de réaction cutanée x 7 jours