

2.98.1 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
TRANSPLANTATION CARDIAQUE
ET ASSISTANCE VENTRICULAIRE
PRÉ BIOPSIE ENDOMYOCARDIQUE
ÉQUIPE DE TRANSPLANTATION



À compléter par le cardiologue de l'équipe de transplantation pré biopsie

I. CLIENTÈLE VISÉE

- ☐ Patient hospitalisé
☐ Patient suivi en externe

II. INDICATION

1. Indication de la biopsie endomyocardique

- ☐ Routine post-transplantation
☐ Rejet myocardique aigu suspecté
☐ Biopsie diagnostique
☐ Autres : _____

2. Accès privilégié

- ☐ Veine jugulaire droite
☐ Veine fémorale droite

III. SOINS PRÉ PROCÉDURE

1. Examens et analyses de laboratoire

- ☐ ECG le matin de la procédure (ou la veille si hospitalisé)
Analyses de laboratoire:
☐ Pour le patient hospitalisé, labos de routine, tels que prévu par l'unité de soins
☐ Pour le patient suivi en externe, selon la requête du centre de prélèvement (feuille rose) complétée par l'équipe de transplantation
☒ Si warfarine (*Coumadin^{MD}*)/héparine, faire INR/PTT le matin de la procédure en STAT
☒ β -HCG sanguin chez la femme fertile ☐ la veille de l'examen
☐ le jour de la procédure en STAT

2. Vérification de l'anticoagulation

- ☒ Préciser si patient sous anticoagulant : _____ (nom de l'anticoagulant)
☒ Si sous héparine : cesser à 4h du matin, le matin de la biopsie
☒ Si sous warfarine (*Coumadin^{MD}*), continuer et viser un INR < 2.0
☒ Si INR $\geq$ 2.0, aviser l'équipe de transplantation au poste 2833 avant de descendre le patient
☐ Cesser anticoagulants (*Coumadin^{MD}*) 48h avant la procédure et reprendre le soir même, sauf si avis contraire
☐ Cesser ☐ Dabigatran (*Pradaxa^{MD}*) ☐ Rivaroxaban (*Xarelto^{MD}*) ☐ Apixaban (*Eliquis^{MD}*) ☐ Edoxaban (*Lixiana^{MD}*)
36 h avant la procédure et reprendre le soir même, sauf si avis contraire
☐ Autres : _____

3. Autres médicaments

- ☐ Lorazépam (*Ativan^{MD}*) ☐ 0,5 mg ou ☐ 1 mg* PO ou SL avant la procédure
OU
☐ Oxazépam (*Sérox^{MD}*) 7,5 À 15 mg* PO avant la procédure
Pour la clientèle externe : maximum 1 dose
*Favoriser la dose minimale pour les patients âgés ou ne prenant pas de benzodiazépine
☐ Autres : _____

Signature du prescripteur : _____

Date : _____ Heure : _____



2.98.1 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
TRANSPLANTATION CARDIAQUE
ET ASSISTANCE VENTRICULAIRE
PRÉ BIOPSIE ENDOMYOCARDIQUE
ÉQUIPE DE TRANSPLANTATION

4. Disposition

- ☒ À jeun à partir de minuit la veille de la biopsie
- ☒ Ne pas donner la médication du matin avant la procédure
- ☒ Installation d'un cathéter en circuit fermé (idéalement CCF #20) dans le pli du coude gauche de préférence
- ☒ Vérifier les sites jugulaire droite et/ou aine droite et effectuer le rasage (tondeuse chirurgicale) au besoin, selon l'accès privilégié
- ☒ Faire descendre le (la) patient(e) en salle d'opération à l'appel
- ☐ Encourager l'hydratation afin de faciliter l'accès veineux (environ 1 litre) à partir de la veille
- ☒ Omettre diurétiques la veille de la procédure (dose du soir seulement)
- ☐ Signes neurovasculaires (CCMSPRO: Chaleur, coloration, mobilité, sensibilité, pouls, remplissage capillaire, oedème) des 4 membres à noter au dossier
- ☐ Remplacer le cathéter jugulaire ou sous-clavière droite par un CCF si équipe traitante d'accord
- ☐ Moniteur cardiaque pour le transfert en salle de biopsie
- ☐ Accompagner le (la) patient(e) par une infirmière du département ou secteur d'origine, pour le transfert en salle de biopsie
- ☐ Autres : _____

Signature du prescripteur : _____

Date : _____ Heure : _____