



\* I C M 3 0 0 \*

**2.98.2 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE**  
**TRANSPLANTATION CARDIAQUE**  
**ET ASSISTANCE VENTRICULAIRE**  
**POST BIOPSIE ENDOMYOCARDIQUE**  
**ÉQUIPE DE TRANSPLANTATION**

À compléter par le cardiologue de l'équipe de transplantation post biopsie

**SOINS POST PROCEDURE**

- Retour sur l'unité de soins : \_\_\_\_\_
- Retour au centre de médecine de jour / court séjour

**1. Examens au retour de la procédure**

- ECG
- RX pulmonaire
- Echo cardiaque

**2. Médication**

- Reprendre la médication usuelle, sauf avis contraire
- Reprendre anticoagulant :  
Nom de l'anticoagulant : \_\_\_\_\_ Posologie : \_\_\_\_\_ À partir du : \_\_\_\_\_ à : \_\_\_\_\_ h
- Héparine IV 25 000 unités / 250 mL D5 %  Ajuster selon protocole 3.19 (sans bolus de départ)\*  
 Reprendre dans \_\_\_\_\_ h au même débit qu'à l'interruption\*
- \* PTT 6 h après la reprise de la perfusion et ajuster selon protocole 3.19
- Autre(s) : \_\_\_\_\_

**3. Soins et surveillance**

- Signes vitaux (FC, FR, TA, SaO<sub>2</sub>, Douleur) à l'arrivée et répéter :
  - Tel que prévu, sur l'unité de soins
  - Avant le départ du patient
  - Aux 30 minutes x 2
  - Autres : \_\_\_\_\_
- Signes neurovasculaires (CCMSPRO: Chaleur, coloration, mobilité, sensibilité, pouls, remplissage capillaire, oedème) à la même fréquence que les signes vitaux, à noter au dossier
- Vérifier et palper le pourtour du site de ponction à l'arrivée :
  - Inguinale droite
  - Jugulaire droite
  - Autres : \_\_\_\_\_
- Diète habituelle dès l'arrivée
- Moniteur cardiaque  pendant \_\_\_\_\_ h ou  ad nouvel ordre
- Mobilisation :
  - Permise au retour de l'intervention
  - Repos au lit pendant 2 h si biopsie fémorale
  - Autre durée du repos au lit : pendant \_\_\_\_\_ h
- Pansement :
  - Vérifier la présence de l'élastoplast au site jugulaire droit. Si non en place, l'installer
  - Enlever pansement compressif inguinal droit dans \_\_\_\_\_ h, puis s'assurer que le diachylon est en place.  
Si non en place, l'installer
  - Conserver le diachylon 24 h
- Autre(s) : \_\_\_\_\_

Signature du prescripteur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_



\* I C M 3 0 0 \*

**2.98.2 - ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE  
TRANSPLANTATION CARDIAQUE  
ET ASSISTANCE VENTRICULAIRE  
POST BIOPSIE ENDOMYOCARDIQUE  
ÉQUIPE DE TRANSPLANTATION**

- Aviser le médecin référent si :
  - Saignement et/ou présence d'hématome au site
  - Douleur importante au site
  - Détérioration CCMSPRO
  - Altération de l'état de conscience
  - Instabilité hémodynamique
  - Détérioration clinique (ex : augmentation de la dyspnée, hypotension symptomatique)
  - Syncope ou lipothymie
  - Fièvre

**4. Planification du congé pour les usagers non hospitalisés (suivis en externe)**

---

- Biopsie endomyocardique via veine jugulaire  
Surveillance 30 minutes
- Biopsie endomyocardique via veine fémorale (inguinal)  
Surveillance 2 h
- Congé autorisé avec visite à la clinique de transplantation **ce jour**
- Retirer le CCF avant départ
- Peut quitter après le temps de surveillance requis vers la clinique de transplantation  
\*Le (la) patient(e) doit s'enregistrer à l'heure de son RV et s'asseoir dans la salle d'attente

Signature du prescripteur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_