

- Appliquer ce protocole pour tous les patients admis en salle de compression pour un réveil

I. SOINS ET SURVEILLANCES

- À l'arrivée, q 15 minutes x 2 heures, q 1 h ad transfert à l'unité de soins
 - Signes vitaux (FC, FR, TA, Saturométrie en O₂, Douleur)
 - Niveau de Sédation (Échelle RASS)
 - Règle de soins # 6 (Surveillance des patients adultes recevant des analgésiques opiacés)
 - Signes neurovasculaires (CCMSPRO: Chaleur, coloration, mobilité, sensibilité, pouls, remplissage capillaire, œdème)
- Température q 30 minutes
- État neurologique (Réaction des pupilles, force motrice) à l'arrivée et PRN
- Échelle d'Aldrete modifié q 15 minutes ad transfert à l'unité de soins
- Moniteur cardiaque, noter et documenter le rythme dans les notes d'observations infirmières à la prise des signes vitaux
- Sites de ponctions et pansements: Vérifier et palper à l'arrivée et q 15 minutes x 1 heure, q 30 minutes x 1 heure et q 4 h
- Bilan Ingesta/Excreta en salle de réveil, si absence de sonde urinaire, indiquer les mictions perdues
- Mettre la couverture chauffante à l'arrivée et cesser lorsque T ° ≥ 37° C
- Patient diabétique : Glycémie capillaire à l'arrivée puis q 4 h

II. CRITÈRES POUR TRANSFERT À L'UNITÉ DE SOINS

- Observer à la salle de compression pour la durée indiquée par l'anesthésiologiste sur l'OPI 2.85
- Patient peut transférer à l'unité de soins lorsqu'échelle d'Aldrete modifié atteint 9/10
- Douleur résiduelle absente ou identique à celle évaluée avant la procédure si douleur préexistante
- Lors du transfert à l'unité de soins, procéder au rapport interservices selon la procédure DSI « Transmission de l'information au point de transition des soins – services d'électrophysiologie et d'hémodynamie »

III. ÉCHELLE D'ALDRETE MODIFIÉE

Critère	Résultat	Score
Motricité	Immobile	0
	Bouge 2 membres	1
	Bouge 4 membres	2
Respiration	Apnée	0
	Ventilation superficielle, dyspnée	1
	Ventilation profonde, toux efficace	2
Variation de la pression artérielle systolique	+/- 50 mm Hg à la valeur mesurée pré-procédure	0
	De 20 à 50 mm Hg à la valeur mesurée pré-procédure	1
	+/- 20 mm Hg à la valeur mesurée pré-procédure	2
Conscience	Aréactif	0
	Réactif à la demande	1
	Réveillé	2
Sa O₂	Inférieure à 90% malgré apport O ₂	0
	Supérieure à 90% grâce à apport O ₂	1
	Supérieure à 92% à l'air ambiant	2