

## 7.23 RETRAIT DES POINTS DE SUTURE

### MATÉRIEL :

- Tige montée de Chlorexidine 0.05%
- Compresse 10cm X 10cm
- Kit pour retrait de suture

### PROCÉDURE :

- Se laver les mains
- Mettre des gants non stériles
- Désinfecter la peau avec une tige montée de chlorexidine, à l'endroit où on enlève les points
- En se servant de la pince, tirer délicatement sur un des deux bouts de fil qui composent le point
- Débuter par le 2<sup>e</sup> nœud, puis poursuivre avec le 4<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, ainsi de suite. Si les lèvres de la plaie ne s'ouvrent pas, poursuivre avec les autres nœuds.
- Couper sous le nœud, un seul côté de la boucle (voir illustration)
- Tirer sur le fil, s'assurer qu'il est retiré en entier

### Attention :



S'il y a présence de déhiscence des lèvres de la plaie; cesser de retirer les sutures, appliquer des adhésifs cutanés (steristrip), appliquer un pansement sur la plaie et aviser le médecin

### NOTES AU DOSSIER :

- Indiquer le retrait des points (nombre et site)
- Noter l'aspect de la plaie
- Noter la présence ou non de bandes adhésives cutanées (stéristrip)

#### ➔ Principe de base :

Toujours couper le fil sous le nœud



Révisé DSI : Octobre 2010  
Approuvé CII : Février 2011

Référence : Révisé à partir de la dernière version 2005  
AQESSS : technique de retrait des sutures :  
<http://msi.aqesss.qc.ca/methodes/afficher.aspx?id=582&section=tech>