



ASA, Acide acétylsalicylique

(Aspirine^{MC}, Entrophen^{MC}, Novasen^{MC}, Rivasa^{MC})

CLASSE :

Antiplaquettaire – Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire

Effets

- ◆ Prévient la formation de caillots dans le sang.

Indications

- ◆ Diminuer les risques d'infarctus et d'angine.
- ◆ Diminuer les risques d'un caillot sanguin.
- ◆ Diminuer les risques d'AVC (Accident Vasculaire Cérébral) et de thrombose.

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement une fois par jour sans égard aux repas.
- ◆ Si le comprimé est enrobé, le prendre tel quel sans le croquer ni l'écraser.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

ASA, Acide acétylsalicylique

(Aspirine^{MC}, Entrophen^{MC}, Novasen^{MC}, Rivasa^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Douleurs à l'estomac. La prise d'aliments peut aider à diminuer ces effets indésirables.
- ◆ Saignement inhabituel : nez, gencives, urine, selles noires, ecchymoses (bleus). Avisez votre médecin ou pharmacien si cela se produit.

Précautions

- ◆ Si vous devez subir une intervention dentaire ou une chirurgie, mentionnez la prise de ce médicament avant l'intervention.
- ◆ Ne pas cesser ce médicament sans l'autorisation de votre cardiologue.
- ◆ Attention aux médicaments vendus sans ordonnance qui contiennent des anti-inflammatoires (ex : Advil^{MC}, Motrin^{MC}, etc). Consultez votre pharmacien à ce sujet.

Notes
