



## Diclofenac (Voltaren <sup>MC</sup>), Ibuprofène (Motrin <sup>MC</sup>, Advil <sup>MC</sup>), Indométhacine (Indocid <sup>MC</sup>), Naproxen (Naprosyn <sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

### Effets

- ◆ Diminuent l'inflammation
- ◆ Diminuent certaines douleurs

### Indications

- ◆ Péricardite
- ◆ Douleur causé par de l'inflammation

### Mode d'administration

- ◆ Prendre avec les repas ou avec une collation pour éviter l'irritation de l'estomac.
- ◆ Prendre régulièrement, tous les jours, pour s'assurer de l'efficacité du médicament sur l'inflammation et la douleur. Il peut s'écouler quelques semaines avant d'obtenir une efficacité maximale.

## Diclofenac (Voltaren <sup>MC</sup>), Ibuprofène (Motrin <sup>MC</sup>, Advil <sup>MC</sup>), Indométhacine (Indocid <sup>MC</sup>), Naproxen (Naprosyn <sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Nausées.
- ◆ Brûlures d'estomac.
- ◆ Enflure dans les jambes (si ceci persiste plus de quelques jours, consultez votre médecin).
- ◆ Rarement : fièvre, démangeaisons, selles noires (consultez votre médecin).

### Précautions

- ◆ Si vous prenez des anticoagulants (Ex : Coumadin, Sintrom) ou si vous êtes connu comme ayant des problèmes d'insuffisance cardiaque, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce type de médicament.

### Notes

---

---

---

---