



## Nicorandil (Ikorel<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Antiangineux

### Effets

- ◆ Produit un effet vasodilatateur qui provoque une meilleure distribution du flot sanguin au niveau du cœur. Réduit également la consommation d'oxygène par le cœur.

### Indications

- ◆ Anti-angineux pour des patients symptomatiques réfractaires à une thérapie habituelle optimale.

### Mode d'administration

- ◆ La posologie est généralement d'une dose deux à trois fois par jour.
- ◆ Avec ou sans nourriture.

## Nicorandil (Ikorel<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Aphtes.
- ◆ Ulcération buccale et anale.
- ◆ Céphalées (maux de tête).
- ◆ Hypotension (Faites attention aux changements de position. Levez-vous lentement).
- ◆ Vertiges.

### Précautions

- ◆ Important : en cas d'apparition d'aphtes ou d'ulcérations, consultez votre professionnel de la santé.
- ◆ L'Ikorel<sup>®</sup> n'est pas disponible dans les pharmacies canadiennes. Le médicament vous sera servi par la pharmacie de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Aviser l'équipe 2 semaines avant la fin de vos comprimés afin de ne pas en manquer.

### Notes

---

---

---

---

---