



Amiodarone (Cordarone^{MC})

CLASSE :

Antiarythmique

Effets

- ◆ Effet anti arythmique (régularise les battements cardiaques)

Indications

- ◆ Arythmie cardiaque

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement avec les repas, tel que prescrit, même si vous vous sentez bien.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne doublez jamais la dose).

Amiodarone (Cordarone^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Principaux : nausées, perte d'appétit, constipation, maux de tête, étourdissements, tremblements, fatigue et parfois cauchemars.
- ◆ Irritation de l'estomac (prendre en mangeant pour diminuer l'irritation)
- ◆ Peut rendre votre peau plus sensible au soleil. Utilisez un écran solaire adéquat (FPS 30 ou plus).
- ◆ Consultez votre médecin si : difficulté respiratoire, battements de cœur irréguliers, vision embrouillée ou halos autour des sources lumineuses, fatigue inhabituelle, perte ou gain de poids, coloration gris bleuté de la peau.
- ◆ Les effets secondaires de ce médicament peuvent persister longtemps même après son arrêt, car il s'élimine très lentement de l'organisme.

Précautions

- ◆ Soyez fidèle aux prises de sang (hormones thyroïdiennes) ou autres examens (poumons, yeux, etc.) qui vous sont prescrits par votre médecin. Ils permettent de suivre les effets secondaires du médicament.
- ◆ L'amiodarone peut interagir avec certains autres médicaments, alors il est important de mentionner la prise de ce médicament si vous consultez un autre médecin ou pharmacien.
- ◆ La consommation de pamplemousse ou de son jus peut interférer avec le métabolisme de l'amiodarone. Éviter de consommer du pamplemousse et son jus.

Notes
