



Digoxine (Lanoxin^{MC}, Toloxin^{MC})

CLASSE :

Antiarythmique - Cardiotonique

Effets

- ◆ Renforce les contractions du cœur.
- ◆ Ralentit la fréquence cardiaque.
- ◆ Régularise les battements cardiaques.

Indications

- ◆ Troubles de rythme cardiaque.
- ◆ Insuffisance cardiaque.

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement, sans égard aux repas, tel que prescrit, même si vous vous sentez bien.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne doublez jamais la dose).

Digoxine (Lanoxin^{MC}, Toloxin^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Généralement bien toléré.
- ◆ Si nausées, vomissements, diarrhée, vision embrouillée, halos jaunes dans votre champ de vision, battement de cœur irréguliers, consultez un médecin sans tarder.

Précautions

- ◆ Plusieurs médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la digoxine et parfois même la rendre toxique. Toujours valider avec votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament.
- ◆ Demandez de vous faire expliquer comment prendre votre pouls. Vous pourrez le vérifier vous-même à la maison. Consultez votre médecin si votre cœur bat moins de 50 fois par minute.
- ◆ Il est important d'être fidèle aux prises de sang prescrites par votre médecin, car elles permettent de vérifier la quantité de médicament dans votre sang.

Notes
