



Dofetilide (Tikosyn^{MC})

CLASSE :

Antiarythmique

Effets

- ◆ Permet de prévenir les troubles du rythme cardiaque.

Indications

- ◆ Arythmie cardiaque.

Mode d'administration

- ◆ Généralement une dose deux fois par jour.
- ◆ Prendre régulièrement, sans égard aux repas, tel que prescrit, même si vous vous sentez bien.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

Dofetilide (Tikosyn^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Maux de tête.
- ◆ Étourdissements.
- ◆ Douleurs dans la poitrine.

Précautions

- ◆ Le Tikosyn[©] n'est pas disponible dans les pharmacies canadiennes. Le médicament vous sera servi par la pharmacie de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Aviser l'équipe 2 semaines avant la fin de vos capsules afin de ne pas en manquer.
- ◆ Plusieurs interactions médicamenteuses peuvent survenir. Toujours aviser les professionnels de la santé que vous prenez ce médicament.

Notes

- ◆ En cas de question sur ce médicament ou ses interactions médicamenteuses communiquer avec le pharmacien au 514-376-3330 poste 3775.