



Flecainide (Tambocor^{MC})

CLASSE :

Antiarythmique

Effets

- ◆ Effet anti arythmique (régularise les battements cardiaques).

Indications

- ◆ Arythmie cardiaque.

Mode d'administration

- ◆ Prenez ce médicament régulièrement, aux mêmes heures, deux fois par jour sans égard aux repas, pour toute la durée prévue du traitement
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).
- ◆ Dans certains cas, le médicament peut être prescrit pour une dose unique si vous avez des palpitations. Suivez les indications de votre médecin.

Flecainide (Tambocor^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Étourdissements (levez-vous lentement)
- ◆ Nausées
- ◆ Troubles de la vision
- ◆ Cephalées (maux de tête)
- ◆ Fatigue inhabituelle
- ◆ Palpitations (cœur qui bat vite)
- ◆ Difficulté à respirer

Précautions

- ◆ La Flecainide peut interagir avec certains autres médicaments, alors il est important de mentionner la prise de ce médicament si vous consultez un autre médecin ou pharmacien.

Notes
