



Amlodipine (Norvasc^{MC}), Nifedipine (Adalat^{MC}), Felodipine (Plendil^{MC})

CLASSE :

Bloqueur des canaux calciques (dihydropyridines)

Effets

- ◆ Dilate les vaisseaux sanguins, ce qui diminue la tension artérielle, le travail du cœur et ses besoins en oxygène.

Indications

- ◆ Prévention des crises d'angine.
- ◆ Hypertension artérielle

Mode d'administration

- ◆ Prendre ce médicament à intervalles régulièrement durant la journée et de façon continue, même si vous vous sentez bien.
- ◆ Si l'on vous prescrit un médicament à action prolongée (Ex : Adalat XL), prenez-le tel quel, sans le croquer ni l'écraser.

Amlodipine (Norvasc^{MC}), Nifedipine (Adalat^{MC}), Felodipine (Plendil^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Au début, vous pourriez ressentir des étourdissements ou des nausées. Ces effets disparaissent généralement en quelques jours.
- ◆ Si vous ressentez de l'enflure au niveau des jambes, ou des battements irréguliers du cœur, consultez votre médecin.

Précautions

- ◆ Si l'on vous prescrit Adalat XL, vous devez éviter de manger du pamplemousse et/ou boire son jus en tout temps.
- ◆ La consommation de pamplemousse ou de son jus peut interférer avec le métabolisme de la nifedipine et de la felodipine. Éviter de consommer du pamplemousse et son jus.

Notes
