



Diltiazem (Cardizem^{MC}, Tiazac^{MC})

CLASSE :

Bloqueur des canaux calciques (non dihydropyridine)

Effets

- ◆ Dilate les vaisseaux sanguins, ce qui diminue la tension artérielle, le travail du cœur, et les besoins en oxygène.
- ◆ Ralentit la fréquence cardiaque.

Indications

- ◆ Prévention des crises d'angine
- ◆ Hypertension artérielle
- ◆ Fibrillation auriculaire (FA)

Mode d'administration

- ◆ Prendre ce médicament à intervalles réguliers durant la journée de façon continue, même si vous vous sentez bien.
- ◆ Si l'on vous prescrit un médicament à action prolongée (ex : Cardizem SR, Cardizem CD, Tiazac XC), prenez-le sans le croquer ni l'écraser.

Diltiazem (Cardizem^{MC}, Tiazac^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Au début, vous pourriez ressentir des maux de tête, des étourdissements, des nausées ou une sensation de chaleur au niveau du visage. Ces effets disparaissent généralement en quelques jours (sinon, consultez votre médecin).
- ◆ Constipation.
- ◆ Si vous ressentez de l'enflure au niveau des jambes : consultez votre médecin.

Précautions

- ◆ La consommation de pamplemousse ou de son jus peut interférer avec le métabolisme du diltiazem. Éviter de consommer du pamplemousse et son jus.
- ◆ Demandez de vous faire expliquer comment prendre votre pouls. Vous pourrez le vérifier vous-même à la maison. Consultez votre médecin si votre cœur bat moins de 50 fois par minute.

Notes
