



Bupropion (Zyban^{MC})

CLASSE :

Antidépresseur – Aide antitabagique

Effets

- ◆ Diminue les maux de tête, l'irritabilité et les troubles de l'attention liés à l'arrêt tabagique.
- ◆ Aide à arrêter de fumer.

Indications

- ◆ Dépendance à la nicotine.

Mode d'administration

- ◆ Prendre 1 comprimé 1 fois par jour pendant 3 jours puis augmenter à deux fois par jour par la suite (prendre la dernière prise vers 16-17h, au minimum 8h après la dernière dose). Peut être pris avec ou sans nourriture.
- ◆ Le traitement dure habituellement de 7 à 12 semaines mais pourrait être poursuivi jusqu'à 1 an afin de prévenir les rechutes.
- ◆ Si nécessaire, vous pourriez utiliser un substitut à la nicotine en plus de votre traitement avec le Zyban. Renseignez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien.

Bupropion (Zyban^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Les effets secondaires par ordre de fréquence (du plus fréquent au moins fréquent) : insomnie (d'où l'importance de la deuxième prise en milieu d'après-midi plutôt qu'en soirée), sécheresse de la bouche (sucrer des glaçons), constipation (++) ou diarrhée (+), maux de cœur, étourdissement, tremblement.

Précautions

- ◆ Ne pas croquer ni écraser le comprimé puisque le comprimé doit être intact afin de libérer graduellement le médicament.
- ◆ Il est conseillé d'éviter l'alcool durant le traitement.
- ◆ Il est conseillé d'arrêter de fumer dans les 8 à 14 jours qui suivent le début du traitement.

Notes
