



INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTRÉAL

Carte d'informations pour
les personnes ayant fait une
Thrombocytopénie Induite par
l'Héparine (HIT)

Informations personnelles :

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : () _____ - _____

Date de naissance : _____

Date de la réaction : _____

Le porteur de cette carte est

allergique à l'héparine

Autres allergies :

Pliez ici

C'est quoi un HIT?

La thrombocytopénie induite par l'héparine un effet indésirable rare de type allergique qui se manifeste par une diminution importante des plaquettes sanguines. Cette réaction peut entraîner la formation de caillots. Elle doit donc être traitée afin de prévenir une thrombose. Le traitement est généralement de 3 mois, avec un anticoagulant oral tel que le Coumadin®.

Après le traitement, la personne demeure à risque de refaire une nouvelle réaction si elle est remise en contact avec de l'héparine ou ses dérivés.

Mise en garde

- Éviter tous les médicaments contenant de l'héparine et toutes les héparines de faible poids moléculaire
- En cas de doute, contactez le pharmacien
- Portez un bijou d'alerte médicale (ex : un bracelet MedicAlert®)



INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTRÉAL

5000, rue Bélanger
Montréal (Québec) H1T 1C8
CANADA

Téléphone : (514) 376-3330