



## Clopidogrel (Plavix<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Antiplaquettaire – Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire

### Effets

- ◆ Prévient la formation de caillots dans le sang.

### Indications

- ◆ Diminuer les risques d'infarctus et d'angine.
- ◆ Diminuer les risques d'un caillot sanguin après la pose d'un « stent ».
- ◆ Diminuer les risques d'AVC (Accident Vasculaire Cérébral) et de thrombose.

### Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement une fois par jour sans égard aux repas, pour toute la durée prévue du traitement.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).
- ◆ Si vous prenez déjà de l'Aspirine<sup>MC</sup> ou de l'Entrophen<sup>MC</sup>, continuez-le pendant toute la durée de votre traitement avec le Plavix<sup>MC</sup>, à moins d'avis contraire de votre médecin.

## Clopidogrel (Plavix<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Douleurs à l'estomac. La prise d'aliments peut aider à diminuer ces effets indésirables.
- ◆ Saignement inhabituel : nez, gencives, urine, selles noires, ecchymoses (bleus). Avisez votre médecin ou pharmacien si cela se produit. **Ne pas arrêter votre médicament.**
- ◆ Si vous développez un effet secondaire grave (ex : rash : rougeur importante soudaine), communiquez avec votre cardiologue, il vous donnera la conduite à adopter. **Ne pas arrêter votre médicament.**

### Précautions

- ◆ Si vous devez subir une intervention dentaire ou une chirurgie, mentionnez la prise de ce médicament avant l'intervention.
- ◆ **Ne pas cesser ce médicament sans l'autorisation de votre cardiologue.**
- ◆ Attention aux médicaments vendus sans ordonnance. Consultez votre pharmacien à ce sujet.
- ◆ Éviter la consommation de certains produits naturels qui pourraient interagir avec le médicament (ex : ail, ginkgo biloba, millepertuis, etc). Consultez votre pharmacien pour plus d'informations.
- ◆ La consommation de pamplemousse ou de son jus peut interférer avec le métabolisme du Plavix<sup>MC</sup>. Il ne faut pas consommer de pamplemousse.

### Notes