

CONDUITE À SUIVRE EN CAS DE CHOC ANAPHYLACTIQUE ET AUTRES RÉACTIONS SECONDAIRES POST VACCINATION INFLUENZA ET PNEUMOCOQUE

CONDITION PRÉALABLE

Tous les vaccinateurs doivent connaître les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire et maintenir à jour leurs connaissances.

DÉFINITION


L'anaphylaxie est une réaction allergique grave et précoce qui suit l'administration d'une substance étrangère et qui peut être fatale dans certains cas. Elle se caractérise par un début soudain et une progression rapide des signes et symptômes.

Aviser le médecin dès l'apparition de signes bénins d'alerte

IMPORTANT : L'infirmière n'est pas autorisée à donner l'adrénaline sans ordonnance médicale

Le tableau suivant démontre la progression des signes et symptômes évoluant avec la gravité de la réaction

SIGNES ET SYMPTÔMES DE L'ANAPHYLAXIE SELON L'ÉVOLUTION CLINIQUE ET L'INTENSITÉ DE LA RÉACTION

Évolution clinique	Signes et symptômes	Intensité de la réaction
 Signes bénins d'alerte précoce	Démangeaisons cutanées, éruptions et oedème au point d'injection, étourdissements, sensation générale de chaleur	Bénigne
	OEdème indolore de certaines parties du corps (visage, bouche), flushing, prurit, congestion nasale, éternuements, larmolement.	Bénigne à modérée
	Voix rauque ou enrouée, sensation de malaise, vomissements, oedème de la gorge, difficulté respiratoire, douleurs abdominales	Modérée à grave
	Symptômes mettant la vie en Danger	Respiration sifflante, bruyante, difficile, collapsus cardiovasculaire, chute de la tension artérielle, pouls faible et irrégulier

Réf : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/adrenaline-1-1000/>

<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/protocole-d-intervention-dans-le-cas-d-anaphylaxie-en-milieu-non-hospitalier/>

Les symptômes surviennent habituellement dans les 15 premières minutes.

MATÉRIEL D'URGENCE

- Sphygmomanomètre
- Stéthoscope
- Saturomètre
- 2 ampoules d'adrénaline (1 :1000)
- Seringues à tuberculine de 1 mL avec aiguilles de calibre 25 de 2,5 cm (1 po) de longueur
- Tampons antiseptiques
- Compresses 2x2

A-INTERVENTIONS auprès d'un patient hospitalisé

- Faire signaler en stat le médecin dès l'apparition de signes bénins d'alerte.
- Lancer le code si difficulté respiratoire ou arrêt cardio-respiratoire
- Coucher le patient sur le dos, les jambes surélevées (position Trendelenbourg)
- Administrer oxygène venti-masque
- Surveiller et contrôler les signes vitaux

B-INTERVENTIONS auprès d'un aidant naturel

- Dès l'apparition de signes bénins d'alerte.
- Coucher le patient sur une civière jambes surélevées
- Administrer oxygène ventimasque
- Lancer le code si difficulté respiratoire ou arrêt cardio-respiratoire
- Avisez l'urgence en stat au poste 3000.
- Transférer l'aidant naturel à l'urgence

Compléter le formulaire Rapport de manifestations cliniques survenues après une vaccination de la Direction de la santé publique (formulaire ESPRI) disponible dans le cartable de vaccination et l'acheminer à la pharmacie qui assurera le suivi avec la Direction de la santé publique.

Réf : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/adrenaline-1-1000/>

<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/protocole-d-intervention-dans-le-cas-d-anaphylaxie-en-milieu-non-hospitalier/>