



Dabigatran (Pradaxa^{MC})

CLASSE :

Anticoagulant – Inhibiteur direct de la thrombine

Effets

- ◆ Éclaircit le sang.

Indications

- ◆ Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) causé par la fibrillation auriculaire.
- ◆ Prévention de la thrombose.

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement 2 fois par jour sans égard à la nourriture.
- ◆ La capsule de Pradaxa^{MC} ne doit pas être ouverte, croquée, écrasée ou dissoute. Si vous ne pouvez pas avaler la capsule entière, communiquez avec votre médecin.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

Dabigatran (Pradaxa^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Le Pradaxa^{MC} peut causer des malaises à l'estomac. Si vous en ressentez, prenez-le en mangeant ou communiquez avec votre médecin.
- ◆ Saignement inhabituel : nez, gencives, urine, selles noires, ecchymoses (bleus). Avisez votre médecin ou pharmacien si cela se produit. **Ne pas arrêter votre médicament.**

Précautions

- ◆ Si vous devez subir une intervention dentaire ou une chirurgie, mentionnez la prise de ce médicament avant l'intervention.
- ◆ **Ne pas cesser ce médicament sans l'autorisation de votre médecin.**
- ◆ Attention aux médicaments vendus sans ordonnance qui contiennent des anti-inflammatoires (ex : Advil^{MC}, Motrin^{MC}, etc.) Consultez votre pharmacien à ce sujet.
- ◆ Éviter la consommation de certains produits naturels qui pourraient interagir avec le médicament (ex : ail, ginkgo biloba, millepertuis, etc). Consultez votre pharmacien pour plus d'informations.
- ◆ Conservez le produit dans son emballage original afin de le protéger de l'humidité.

Notes

- ◆ Le Pradaxa^{MC} ne nécessite pas de suivi pour mesurer son activité anticoagulante