



DIGOXINE (LANOXIN OU TOLOXIN)

Bénéfices du traitement

- Renforce les contractions de votre cœur et augmente son efficacité.
- Ralentit les pulsations cardiaques et diminue la charge de travail sur votre cœur.
- Diminue les symptômes reliés à l'insuffisance cardiaque et prévient les hospitalisations.

Effets secondaires possibles

Les effets secondaires dépendent de la dose du médicament, du fonctionnement de vos reins ainsi que du taux de potassium et de magnésium dans le sang. Des prises de sang seront effectuées afin de surveiller ces paramètres et prévenir l'apparition d'effets indésirables.

Effets secondaires	Actions à poser
Faiblesse, étourdissements et/ou sensation de s'évanouir	<ul style="list-style-type: none">• Prenez votre pression artérielle et vos pulsations cardiaques sur une base régulière selon les recommandations de votre équipe traitante et lors des malaises. Notez vos résultats et apportez-les lors des rendez-vous médicaux.• Effectuez les examens lorsque demandés (Exemples : électrocardiogramme (ECG) ou Holter). <p><u>Appelez le 911 ou présentez-vous à l'urgence si :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Vous perdez connaissance.<ul style="list-style-type: none">• Vos symptômes sont accompagnés de pulsations cardiaques plus basses que 50 par minute.

Il existe un risque d'accumulation de ce médicament dans le sang :

Avisez rapidement votre équipe traitante si vous présentez :

- Vision trouble ou halo sous forme de tâche jaune-verdâtre.
- Perte d'appétit, des nausées, des vomissements et des diarrhées **intermittentes et inhabituelles**.
- Augmentation de la fatigue accompagnée de somnolence.

** Un ajustement de la dose permet généralement de corriger les symptômes

Appelez le 911 ou présentez-vous à l'urgence la plus proche en cas de :

- Diarrhées, de nausées ou de vomissements **sévères et prolongés (48h et plus)**.
- Changement dans le comportement, un état de confusion ou des hallucinations.
- Somnolence extrême ou d'une perte de connaissance.



Ne jamais cesser brusquement la prise ce médicament, sauf sur avis d'un professionnel de la santé.