



## Furosemide (Lasix<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Diurétique de l'Anse

### Effets

- ◆ Élimine le surplus d'eau (enflure).
- ◆ Diminue le travail du cœur.

### Indications

- ◆ Insuffisance cardiaque.
- ◆ Œdème (ex : jambes enflées)

### Mode d'administration

- ◆ Prendre ce médicament régulièrement, même si vous vous sentez bien.
- ◆ Prendre de préférence tôt dans la journée pour éviter de vous lever la nuit pour uriner.

## Furosemide (Lasix<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Fait uriner plus souvent (conséquence de l'action du médicament) et peut augmenter la soif.
- ◆ Peut rendre votre peau plus sensible au soleil. Utiliser un écran solaire adéquat (FPS 30 ou plus).
- ◆ Si vous ressentez une diminution de l'audition ou un bourdonnement dans les oreilles, consultez votre médecin

### Précautions

- ◆ Éviter les excès de sel et les aliments qui en contiennent (ex : Sel ENO, Rolaid's ...).
- ◆ Pour certains patients, un supplément en potassium (médicament ou dans l'alimentation) est nécessaire à cause de la perte de potassium dans l'urine causée par l'action du diurétique. Renseignez-vous bien auprès de votre médecin ou pharmacien.
- ◆ Il est très important de respecter la limite de liquide prescrite par votre médecin pour éviter de demander un effort trop important à votre cœur.

### Notes

---

---

---

---