



Métolazone (Zaroxolyn^{MC})

CLASSE :

Diurétiques

Effets

- ◆ Élimine le surplus d'eau (enflure).
- ◆ Augmente l'efficacité du furosémide.

Indications

- ◆ Insuffisance cardiaque.

Mode d'administration

- ◆ Prendre ce médicament régulièrement, même si vous vous sentez bien.
- ◆ Prendre de préférence tôt dans la journée pour éviter de vous lever la nuit pour uriner.
- ◆ Si vous devez aussi prendre du Lasix (furosémide), prenez votre Zaroxolyn (métolazone) en même temps que le Lasix.

Métolazone (Zaroxolyn^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Généralement bien toléré.
- ◆ Fait uriner plus souvent (conséquence de l'action du médicament) et peut augmenter la soif.
- ◆ Si vous ressentez une diminution de l'audition ou un bourdonnement dans les oreilles, consultez votre médecin.

Précautions

- ◆ Éviter les excès de sel et les aliments qui en contiennent.
- ◆ Pour certains patients, un supplément en potassium (médicament ou dans l'alimentation) est nécessaire à cause de la perte de potassium dans l'urine causée par l'action du diurétique. Renseignez-vous bien auprès de votre médecin ou pharmacien.
- ◆ Il est très important de respecter la limite de liquide prescrite par votre médecin pour éviter de demander un effort trop important à votre cœur.

Notes
