



DIURÉTIQUE DE L'ANSE [FUROSÉMIDE *LASIX* ET ACIDE ÉTHACRYNIQUE *EDECIN*]

Bénéfices du traitement

- Permet l'élimination du surplus de liquide présent dans le corps en augmentant la fréquence et la quantité des urines.
- Réduit les symptômes d'essoufflement et de rétention d'eau (enflure des jambes et gonflement abdominal).

Effets secondaires possibles

Les effets secondaires se présentent principalement en début de traitement ou après une augmentation de la dose.

Si les **symptômes s'aggravent** ou **persistent**, avisez votre équipe traitante.

Effets secondaires	Actions à poser
Déshydratation	<p>Reconnaitre les symptômes de déshydratation :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sécheresse de la bouche, soif excessive, fatigue, étourdissements, urine plus foncée qu'à l'habitude, crampes musculaires.• Chez la personne âgée les symptômes peuvent se présenter sous forme de somnolence inhabituelle et/ou état confusionnel. <p><u>Prévenir un état de déshydratation :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous de boire suffisamment, tout en respectant votre limite liquidienne.• Prenez votre poids à tous les matins.
Détérioration de la fonction des reins	<ul style="list-style-type: none">• Effectuez les prélèvements sanguins tels que demandés (habituellement avant chaque rendez-vous).



<p>Débalancement des électrolytes dans le sang (sodium, potassium et calcium)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prenez les suppléments qui vous sont prescrits. • Effectuez les prélèvements sanguins tels que demandés.
<p>Augmentation du taux d'acide urique dans votre sang (hyperuricémie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillez les signes de goutte : de la rougeur/douleur et un gonflement des articulations (ex : orteils, chevilles, doigts). • Avisez votre équipe traitante dès leur apparition. • Évitez les repas riches en protéines (abats, viandes rouges, poissons, fruits de mer) et l'alcool qui peuvent aussi augmenter les taux d'acide urique dans votre sang.