



## Fondaparinux (Arixtra<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Anticoagulant – Inhibiteur sélectif du facteur Xa

### Effets

- ◆ Éclaircit le sang

### Indications

- ◆ Thérapie d'appoint lorsque la warfarin/nicoumalone ne sont pas à leur pleine efficacité (INR non thérapeutique)
- ◆ Traitement et prévention de l'embolie pulmonaire et de la thrombose veineuse profonde.

### Mode d'administration

- ◆ 1 injection sous-cutanée une fois par jour.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

## Fondaparinux (Arixtra<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Diminution des taux de globules rouges (anémie)
- ◆ Nausées, vomissements
- ◆ Il peut causer de la constipation pour la prévenir, buvez beaucoup, prenez plus de fibres alimentaires
- ◆ Boutons et Rougeur sur la peau
- ◆ Fièvre
- ◆ Saignements excessifs, soyez prudent afin d'éviter les blessures

### Précautions

- ◆ Attention aux médicaments vendus sans ordonnance qui contiennent des anti-inflammatoires (ex : Advil<sup>MC</sup>, Motrin<sup>MC</sup>, etc.) Consultez votre pharmacien à ce sujet.
- ◆ Éviter la consommation de certains produits naturels qui pourraient interagir avec le médicament (ex : ginkgo biloba, omega 3, etc).

### Notes

Ce médicament est habituellement utilisé pour les personnes allergiques à l'héparine