

## GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES AU FER I.V.

### IDENTIFIER les conditions qui augmentent les risques d'effets indésirables :

- Réaction antérieure à une perfusion de fer I.V.
- Perfusion rapide de fer
- Antécédents d'allergies multiples (médicament ou autres)
- Asthme sévère ou eczéma
- Maladie inflammatoire généralisée
- (p. ex. polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux)
- Âge avancé
- Maladie respiratoire ou cardiaque sévère
- Traitement par des bêta-bloquants ou des inhibiteurs d'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA)
- Grossesse (la perfusion de fer par voie I.V. est contre-indiquée durant le premier trimestre de grossesse)

### INFORMER l'utilisateur sur les effets indésirables possibles et lui demander d'en aviser le personnel soignant s'ils surviennent :

- Bouffées vasomotrices au visage, douleur lombaire et/ou oppression thoracique, dyspnée.

**EXPLIQUER** que ces effets indésirables se présentent plus souvent en début de perfusion et qu'ils disparaissent à l'arrêt de la perfusion, sans réapparaître à la reprise de la perfusion.

**EXPLIQUER** à l'utilisateur que certains effets indésirables (Céphalées, douleurs articulaires) peuvent survenir quelques heures ou jours après la perfusion.

### SURVEILLER et prendre les signes vitaux avant, pendant et jusqu'à 30 minutes après la fin de la perfusion :

- Pression artérielle
- Pouls
- Température
- Saturation O<sub>2</sub> (SaO<sub>2</sub>) et/ou fréquence respiratoire

