

GUIDE D'UTILISATION

Administration de chloroprocaine (*Nesacaine^{MD}*) chez les patients allergiques à la lidocaïne

*** NE PAS ADMINISTRER LA CHLOROPROCAÏNE PAR VOIE IV ***

I. INDICATIONS

Anesthésie locale ou régionale chez les patients ayant une allergie confirmée à la lidocaïne (*Xylocaïne^{MD}*) ou autres anesthésiques locaux de la classe des **AMIDES**

II. CONTRE-INDICATIONS

Allergie confirmée aux anesthésiques de la classe des **ESTERS**

Anesthésique local de la classe des AMIDES	Anesthésique local de la classe des ESTERS
Lidocaïne (<i>Xylocaïne^{MD}</i>)	Chloroprocaine (<i>Nesacaine^{MD}</i>)
Bupivacaïne (<i>Marcaïne^{MD}</i>)	Tetracaïne (<i>Pontocaïne^{MD}</i>)
Ropivacaïne (<i>Naropin^{MD}</i>)	Cocaïne
Mepivacaïne (<i>Carbocain^{MD}</i>)	Procaine (<i>Novocaïne^{MD}</i>)
Prilocaine (<i>Citanest^{MD}, Emla^{MD}</i>)	Benzocaïne (<i>Oraje^{MD}, Hurricaine^{MD}</i>)
Dibucaïne (<i>Nupercaina^{MD}</i>)	Propoxycaïne
Etidocaïne (<i>Duranest^{MD}</i>)	
Articaïne (<i>Astracaïne^{MD}</i>)	

III. MÉDICATION

Chloroprocaine (*Nesacaine^{MD}*) 2%

IV. ADMINISTRATION

Infiltration pour anesthésie locale : dosage similaire à la lidocaïne, dose maximale : 10 mg/kg

Injection pour anesthésie régionale (épidurale) : réservée aux anesthésiologistes

N. B. : **Début d'action** de la chloroprocaine plus lent (6 à 12 min.) que la lidocaïne (1 à 3 min.)