

# Bériplex

(Complexe prothrombique humain)

**\*Aviser la banque de sang pour l'obtention du produit\***

## Indications

- Saignement potentiellement mortel secondaire à la prise de coumadin
- Renverser le coumadin ou sintrom pour une transplantation cardiaque
- Renverser le coumadin ou sintrom pour une chirurgie urgente (<6 heures)

## Contre-indications absolues :

- Patient **allergique à l'héparine** ou histoire de thrombocytopénie à l'héparine (le Beriplex® contient de l'héparine)

**Format :** Beriplex® 25 UI/ml (fiolle 500 UI/ 20 ml)

Dose de départ habituelle :

Patient ≤ 70 kg = 2 vials (40 ml ou 1000 UI)

Patient > 70 kg = 3 vials (60 ml ou 1500 UI)

## Méthode de préparation :



- 1) Pousser jusqu'au « clic »



- 2) Retirer le plastique et laisser l'embout bleu sur la fiolle d'eau stérile



- 3) Mettre le bériplex sur l'embout bleu et tourner la fiolle pour permettre l'écoulement de l'eau stérile dans le bériplex



- 4) Prélever le bériplex pour administrer au patient

## Administration du Bériplex®

- Comme pour l'administration d'un culot, valider le lot et l'identification du patient avant d'administrer
- Ne pas administrer d'autres produits dans la même ligne intraveineuse
- \* Administrer à 200 unités/min IV direct (pour une dose de 1000 unités, durée administration 5 min)\***

## Surveillances infirmières :

- Effets indésirables : Maux de tête, réaction allergique ou anaphylactique, fièvre, complications thromboemboliques

*Il est fortement recommandé d'administrer simultanément de la vitamine K puisque la demi-vie des (CCP) est de 6h. De plus, le délai d'action de la vitamine K intraveineuse est de 4 à 6 heures. L'action thérapeutique du bériplex devrait avoir un impact sur le INR 15min après l'administration du produit.*