



Atorvastatine (Lipitor^{MC}), Fluvastatine (Lescol^{MC}), Lovastatine (Mevacor^{MC}), Pravastatine (Pravachol^{MC}), Rosuvastatine (Crestor^{MC}), Simvastatine (Zocor^{MC})

CLASSE :

Hypocholestérolémiant -Statine

Effets

- ◆ Contrôle les taux élevés de cholestérol (gras) dans le sang, évitant ainsi son accumulation dans les artères.

Indications

- ◆ Prévention des maladies cardio-vasculaires (angine, crise cardiaque).

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement tel que prescrit même si vous ne ressentez aucun symptôme car ce médicament agit à long terme.
- ◆ Prendre le soir au coucher car la synthèse du cholestérol se fait durant la nuit ; le médicament sera alors plus efficace.

Exception :

Prendre Mevacor au souper avec de la nourriture.

Lipitor et Crestor peuvent être pris le matin ou le soir sans diminuer leur efficacité

Atorvastatine (Lipitor^{MC}), Fluvastatine (Lescol^{MC}), Lovastatine (Mevacor^{MC}), Pravastatine (Pravachol^{MC}), Rosuvastatine (Crestor^{MC}), Simvastatine (Zocor^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Généralement bien toléré.
- ◆ Constipation ou diarrhée, nausées, crampes abdominales.
- ◆ Maux de tête.
- ◆ Démangeaisons.
- ◆ Si vous ressentez des douleurs inhabituelles dans les muscles, de la fatigue et de la fièvre, consultez votre médecin.

Précautions

- ◆ Éviter, en tout temps, de manger des pamplemousses ou de boire leur jus si vous êtes traités avec Lipitor, Mevacor ou Zocor.

Notes
