



Cholestyramine (Questran^{MC}), Colesevelam (Lodalis^{MC})

CLASSE :

Hypocholestérolémiant -Résine

Effets

- ◆ Favorise l'élimination de cholestérol.

Indications

- ◆ Hypercholestérolémie
- ◆ Prévention des maladies cardio-vasculaires (angine, crise cardiaque).

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement tel que prescrit, en mangeant.
- ◆ Pour le Questran, généralement un sachet à diluer 2 fois par jours, mais peut aller de 1 à 6 fois par jour.
- ◆ Pour le Lodalis, généralement 3 comprimés deux fois par jour, ou 6 comprimés une fois par jour, ou 1 sachet à diluer une fois par jour.
- ◆ Mélanger la poudre à un grand verre d'eau, prendre les comprimés avec un grand verre d'eau.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

Cholestyramine (Questran^{MC}), Colesevelam (Lodalis^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Constipation
- ◆ Douleurs abdominales
- ◆ Brûlures d'estomac
- ◆ Nausées, vomissements
- ◆ Le Lodalis^{MC} diminue le taux de sucres dans le sang (hypoglycémie)

Précautions

- ◆ La résine peut diminuer l'absorption des médicaments administrés simultanément par voie orale. Il est donc conseillé d'administrer tout médicament au moins 1h avant la résine ou 4 à 6h après.
- ◆ Il est important d'être fidèle aux prises de sang prescrites par votre médecin car elles permettent de vérifier si le médicament produit bien l'effet escompté.

Notes