



**Bénazepril (Losentin^{MC}), Captopril (Capoten^{MC}), Cilazapril (Inhibace^{MC}),
Enalapril (Vasotec^{MC}), Fosinopril (Monopril^{MC}), Lisinopril (Zestril^{MC}),
Perindopril (Coversyl^{MC}), Quinapril (Accupril^{MC}), Ramipril (Altace^{MC}),
Trandolapril (Mavik^{MC})**

CLASSE :

Inhibiteur de L'enzyme de conversion de l'angiotensine

Effets

- ◆ Dilate les vaisseaux ce qui diminue le travail du cœur et ses besoins en oxygène, ainsi que la tension artérielle.

Indications

- ◆ Insuffisance cardiaque
- ◆ Hypertension artérielle
- ◆ Prévention des ACV
- ◆ Prévention des infarctus du myocarde
- ◆ Prévention de la néphropathie diabétique

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement même si vous vous sentez bien.
- ◆ Prendre ce médicament toujours de la même façon (à jeun ou avec le repas).
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne doublez jamais la dose).

**Bénazepril (Losentin^{MC}), Captopril (Capoten^{MC}), Cilazapril (Inhibace^{MC}),
Enalapril (Vasotec^{MC}), Fosinopril (Monopril^{MC}), Lisinopril (Zestril^{MC}),
Perindopril (Coversyl^{MC}), Quinapril (Accupril^{MC}), Ramipril (Altace^{MC}),
Trandolapril (Mavik^{MC})**

Effets secondaires possibles

- ◆ Toux sèche (si persiste, avisez votre pharmacien ou médecin).
- ◆ Goût métallique (diminue habituellement après 2 ou 3 mois).
- ◆ Étourdissements ou sensation de faiblesse en se relevant d'une position assise ou couchée. Si c'est le cas, levez-vous lentement.
- ◆ Rougeurs sur la peau, fièvre, enflure de la gorge (très rare) : consultez rapidement un médecin.

Précautions

- ◆ Sauf si votre médecin vous l'a prescrit, ne prenez pas de suppléments de potassium ou de substitut de sel (ex : No Salt).

Notes
