



Saxagliptin (Onglyza^{MC}), Sitagliptin (Januvia^{MC}), Linagliptine (Trajenta^{MC}), Alogliptine (Nesina^{MC})

CLASSE :

Hypoglycémiant-Inhibiteur de l'enzyme dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)

Effets

- ◆ Aide au contrôle glycémique chez le patient diabétique en augmentant la libération d'insuline suite à un repas.

Indications

- ◆ Diabète de type 2.

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement une fois par jour, au déjeuner de préférence.
- ◆ Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Saxagliptin (Onglyza^{MC}), Sitagliptin (Januvia^{MC}), Linagliptine (Trajenta^{MC}), Alogliptine (Nesina^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Les effets secondaires avec ce médicament sont rares. Néanmoins, diarrhées, nausées, douleurs abdominales (prendre avec de la nourriture), céphalées (maux de tête), étourdissements, infection des voies respiratoires supérieures, peuvent survenir.
- ◆ Ce médicament n'engendre normalement pas d'hypoglycémies s'il est le seul traitement pour le diabète.

Précautions

- ◆ Apprendre à reconnaître les signes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie est très important pour vous permettre de bien contrôler le taux de sucre dans votre sang.
- ◆ Utiliser Onglyza et Nesina avec prudence chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.
- ◆ Contactez votre médecin si des douleurs articulaires sévères et invalidantes survenaient.

Notes
