



Canagliflozine (Invokana^{MC}), Dapagliflozine (Forxiga^{MC}), Empagliflozine (Jardiance^{MC})

CLASSE :

Hypoglycémiant- Inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2)

Effets

- ◆ Contrôle de l'hyperglycémie (taux de sucre dans le sang) chez les diabétiques en augmentant l'élimination du glucose dans les urines.
- ◆ Entraîne aussi une perte de poids et une baisse de la pression artérielle.

Indications

- ◆ Diabète de type 2.

Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement une fois par jour, avant le premier repas de la journée de préférence. (Exception : Le Jardiance peut être pris à n'importe quel moment de la journée)
- ◆ Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez au moment de prendre la dose suivante, prenez le médicament selon l'horaire prévu (ne pas doubler la dose).

Canagliflozine (Invokana^{MC}), Dapagliflozine (Forxiga^{MC}), Empagliflozine (Jardiance^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Hypoglycémie, si associé à d'autres traitements hypoglycémiants (insuline, sulfonylurée)
- ◆ Infections génitales
- ◆ Infections urinaires
- ◆ Augmentation du volume et de la fréquence des urines

Précautions

- ◆ Apprendre à reconnaître les signes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie est très important pour vous permettre de bien contrôler le taux de sucre dans votre sang.
- ◆ Il pourrait être utile de porter, sur vous, une carte indiquant que vous êtes diabétique.
- ◆ Ces médicaments peuvent interagir avec certains autres médicaments, alors il est important de mentionner la prise de ce médicament si vous consultez un autre médecin ou pharmacien.

Notes
