



Dexlansoprazole (Dexilant^{MC}), Esomeprazole (Nexium^{MC}), Lansoprazole (Prévacid^{MC}), Oméprazole (Losec^{MC}), Pantoprazole (Pantoloc^{MC}), Rabéprazole (Pariet^{MC})

CLASSE :

Inhibiteur de la pompe à protons

Effets

- ◆ Diminue la production d'acide dans l'estomac.

Indications

- ◆ Prévention et traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum (début de l'intestin).
- ◆ Reflux du contenu de l'estomac vers l'œsophage.

Mode d'administration

- ◆ Prendre le matin, de préférence 30 minutes avant le premier repas de la journée pour une meilleure efficacité.
- ◆ Ne pas couper ou écraser les comprimés car ils perdraient leur efficacité. Si vous avez de la difficulté à avaler, certaines formulations peuvent être dissoutes. Renseignez vous auprès de votre pharmacien.

Dexlansoprazole (Dexilant^{MC}), Esomeprazole (Nexium^{MC}), Lansoprazole (Prévacid^{MC}), Oméprazole (Losec^{MC}), Pantoprazole (Pantoloc^{MC}), Rabéprazole (Pariet^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Les effets secondaires avec ce médicament sont rares. Les plus fréquents sont les céphalées (maux de tête) et la diarrhée.

Précautions

Notes
