



IVABRADINE [LANCORA]

Bénéfices du traitement

- Ralentit vos pulsations cardiaques pour diminuer la charge de travail sur votre cœur.
- Diminue la mortalité et les hospitalisations associées à l'insuffisance cardiaque.

Effets secondaires possibles

Les effets secondaires peuvent se présenter principalement en début de traitement ou après une augmentation de la dose.

Si les **symptômes s'aggravent** ou **persistent**, avisez votre équipe traitante.

Effets secondaires	Actions à poser
Faiblesse, étourdissements et/ou sensation de s'évanouir	<ul style="list-style-type: none">• Prenez votre pression artérielle et vos pulsations cardiaques sur une base régulière et lors des malaises. Notez vos résultats et apportez-les lors des rendez-vous médicaux.• Effectuez les examens lorsque demandés (exemples : électrocardiogramme (ECG) ou Holter) <p><u>Appelez le 911 ou présentez-vous à l'urgence si :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Vous perdez connaissance.• Les symptômes sont accompagnés de pulsations cardiaques plus basses que 50 par minute.
Palpitations ou pulsations cardiaques irrégulières	<ul style="list-style-type: none">• Signalez cet effet secondaire à votre équipe traitante.• Un électrocardiogramme (ECG) pourrait être demandé.
Troubles visuels : vision brouillée, apparition de tâches lumineuses	<ul style="list-style-type: none">• Effets transitoires, souvent dans les premiers mois de traitement.