



Azithromycine (Zithromax^{MC}), Clarithromycine (Biaxin^{MC})

CLASSE :
Macrolides

Effets

- ◆ Détruit les bactéries causant une infection.

Indications

- ◆ Traitement de plusieurs types d'infections causées par diverses bactéries.

Mode d'administration

- ◆ Prendre à intervalles réguliers durant la journée.
- ◆ Certaines formes de cet antibiotique doivent être prises à jeun, d'autres avec de la nourriture. Vérifier auprès de votre pharmacien le moment idéal pour la prise de votre médicament.
- ◆ Il est très important de prendre toute la quantité prescrite, même si vous vous sentez mieux.

Azithromycine (Zithromax^{MC}), Clarithromycine (Biaxin^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Nausées, crampes abdominales, diarrhée les premiers jours du traitement (si persiste, consultez votre médecin).
- ◆ Si douleurs aiguës à l'estomac, urine foncée, selles pâles, coloration jaune de la peau ou des yeux (effets rares) : consultez votre médecin.
- ◆ Goût métallique (Biaxin^{MC}), disparaît à l'arrêt du traitement.

Précautions

- ◆ Si vous faites encore de la fièvre après 2 à 3 jours de traitement, consultez votre médecin. L'antibiotique n'est peut-être pas efficace.
- ◆ Si l'infection n'est pas complètement disparue à la fin du traitement, consultez votre médecin.
- ◆ Si vous souffrez de problèmes hépatiques (foie), certaines formes de cet antibiotique sont à déconseiller. Vérifiez bien auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.
- ◆ Ce médicament peut diminuer ou augmenter l'effet de plusieurs autres médicaments (ex : Coumadin, Digoxin, Lipitor ...). Informez-vous auprès de votre pharmacien avant de vous procurer des médicaments sans prescription.

Notes
