



Répaglinide (Gluconorm^{MC})

CLASSE :

Hypoglycémiant-Méglitinide

Effets

- ◆ Stimule la libération d'insuline par le pancréas ce qui fait diminuer la glycémie.

Indications

- ◆ Diabète de type 2.

Mode d'administration

- ◆ Prendre 1 dose 3 fois par jour juste avant les repas.

Répaglinide (Gluconorm^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Les effets secondaires avec ce médicament sont rares. Les plus fréquents sont, hypoglycémies, infections des voies respiratoires supérieures, céphalées (maux de tête), diarrhées, constipation, douleurs articulaires et lombaires (dans le dos).

Précautions

- ◆ Si vous sautez un repas, vous devez sauter la dose de ce médicament pour éviter les hypoglycémies. À l'inverse, si un 4^{ème} repas s'ajoute, une 4^{ème} dose de médicament peut être prise. Confirmez cette 4^{ème} dose avec votre médecin ou pharmacien.
- ◆ Prendre la dose juste avant le repas, mais pas plus de 30min avant le repas.
- ◆ Apprendre à reconnaître les signes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie est très important pour vous permettre de bien contrôler le taux de sucre dans votre sang.

Notes
