



Nitroglycerine transdermique (Minitran^{MC}, Nitro-Dur^{MC}, Transderm Nitro^{MC}) (Trinipatch^{MC})

CLASSE : Nitrates transdermiques

Effets

- ◆ Dilate les vaisseaux sanguins, ce qui diminue le travail du cœur et les besoins en oxygène.
- ◆ Le timbre (patch) s'applique sur la peau et libère de petites quantités de médicament de façon continue.

Indications

- ◆ Prévient les crises d'angine.
- ◆ Insuffisance cardiaque

Mode d'administration

- ◆ Appliquer sur la peau propre et sèche et sans poils (vous pouvez couper les poils avec un ciseau mais ne pas raser, car cela favorise une irritation).
- ◆ Choisissez l'endroit qui vous convient le mieux (épaule, thorax, cuisses).
- ◆ Évitez de l'appliquer plus bas que les genoux ou plus bas que les coudes.
- ◆ Lavez vos mains, retirez le timbre de son enveloppe, enlevez le papier protecteur qui est collé au timbre. Appuyez le timbre sur la peau, pressez fermement 10 secondes et passez un doigt autour du timbre en appuyant afin de bien faire adhérer le timbre.
- ◆ Changez l'endroit où vous appliquez le timbre chaque jour pour prévenir une irritation de la peau.
- ◆ Enlevez le timbre au moment prescrit.
- ◆ Pour l'enlever, prenez le milieu avec votre doigt, les rebords se soulèveront et le timbre décollera facilement. Repliez le timbre sur lui-même avant de le mettre à la poubelle.

Nitroglycerine transdermique (Minitran^{MC}, Nitro-Dur^{MC}, Transderm Nitro^{MC}) (Trinipatch^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Rougeurs au visage, maux de tête (surtout au début du traitement). Ces effets diminuent après quelques jours. Prendre de l'acétaminophène (Tylenol^{MC}) pour soulager la douleur au besoin.
- ◆ Étourdissements ou faiblesse en se levant d'une position assise ou couchée. Si c'est le cas, levez-vous lentement.

Précautions

- ◆ Ne pas couper le timbre.

Notes
