



## Nitroglycerine-nitro (Nitrolingual<sup>MC</sup>)

### CLASSE :

Nitrates (vaporisateur)

### Effets

- ◆ Dilate les vaisseaux sanguins ce qui diminue le travail du cœur et le besoins en oxygène.

### Indications

- ◆ Traitement ou prévention des crises d'angine.

### Mode d'administration

- ◆ Utiliser au premier signe d'une douleur sans attendre qu'elle ne devienne très forte.
- ◆ S'asseoir si possible.
- ◆ Si vous n'avez pas utilisé votre vaporisateur depuis plusieurs semaines, faites une vaporisation dans les airs afin de vérifier qu'il fonctionne bien.
- ◆ Tenir le vaporisateur en position verticale et l'avancer le plus près possible de la bouche ouverte.
- ◆ Appuyer sur le bouton pressoir pour faire une vaporisation SUR ou SOUS la langue. Ne pas inhaler la vaporisation.
- ◆ Si après 5 minutes la douleur n'est pas diminuée ou augmente, **contactez les services d'urgence**. Faire une 2e vaporisation. Si vous avez encore des douleurs vous pouvez répéter les vaporisations aux 5 minutes en attendant les services d'urgence.

## Nitroglycerine-nitro (Nitrolingual<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Maux de tête, étourdissements, rougeur au visage (ces effets devraient disparaître rapidement).
- ◆ Hypotension. Faites attention aux changements de position. Levez-vous lentement.

### Précautions

- ◆ Ayez toujours ce médicament avec vous.
- ◆ Ne pas exposer à la chaleur ou au froid.
- ◆ Ne pas perforer ou chauffer car le médicament est contenu sous pression.
- ◆ Assurez-vous régulièrement que votre médicament est encore efficace, en vérifiant la date d'expiration inscrite sur le côté ou sous le flacon.
- ◆ Si une activité particulière provoque des crises d'angine (ex : monter un escalier), vous pouvez prendre une vaporisation 5 minutes avant l'activité, afin de prévenir la douleur.

### Notes

---

---

---

---