

Programme de vaccination des enfants et des adultes contre les infections invasives à pneumocoque

Questions et réponses à l'intention des professionnels de la santé

Octobre 2025

Cette publication a été réalisée par le Sous-ministériat à la prévention et à la santé publique en collaboration avec la Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le présent document s'adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n'est accessible qu'en version électronique à l'adresse : Quebec.ca/publications-santé-services-sociaux

Pour plus d'information : Quebec.ca/gouvernement/santé-services-sociaux

Dépôt légal – 2025

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-555-02454-0 (version PDF)

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d'étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d'en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec, 2025

TABLE DES MATIERES

PRÉSENTATION	4
GÉNÉRALITÉS	5
1. Quels sont les vaccins contre le pneumocoque disponibles au Québec?.....	5
2. Quels vaccins sont utilisés dans le cadre du Programme québécois d'immunisation (PQI)?.....	6
3. Quelles sont les intervalles à utiliser entre deux vaccins Pneu-C?	6
4. Quelle est la conduite à tenir si l'intervalle n'a pas été respecté entre deux vaccins Pneu-C?	6
5. Quelle est la conduite à tenir si un intervalle de moins de 1 an a été utilisé entre un vaccin Pneu-P et un vaccin Pneu-C?	6
VACCINATION DES ENFANTS	7
Programme de vaccination	7
6. Quel est le calendrier régulier des enfants?	7
7. Qui sont les jeunes âgés de moins de 18 ans présentant une condition à risque élevé?.....	8
8. Qui sont les jeunes âgés de moins de 18 ans présentant une condition à risque très élevé?.....	8
9. Est-ce que le Pneu-P est utilisé chez les jeunes âgés de moins de 18 ans?.....	8
10. Pourquoi les enfants à risque très élevé doivent-ils recevoir le vaccin Pneu-C-20 pour toute la série vaccinale de leur calendrier?.....	9
11. Que doit-on faire avec un jeune âgé de 2 à 59 mois qui a débuté sa vaccination avec un calendrier régulier utilisant un vaccin Pneu-C autre que le Pneu-C-15?.....	9
12. Un jeune âgé de moins de 18 ans sans risque particulier qui a déjà complété sa vaccination avec les vaccins Pneu-C-10 et Pneu-C-13 doit-il recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-15?	9
13. Un jeune âgé de moins de 18 ans présentant une condition à risque très élevé qui a déjà complété sa vaccination avec un vaccin Pneu-C autre que le Pneu-C-20 doit-il recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-20?.....	9
14. Un jeune âgé de moins de 18 ans présentant une condition à risque élevé qui a déjà complété sa vaccination avec un vaccin Pneu-C autre que le vaccin Pneu-C-15 ou Pneu-C-20 doit-il recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-15?	9
Situations particulières	10

15. Un enfant qui est considéré comme adéquatement vacciné peut-il recevoir une dose de Pneu-C-15 ou Pneu-C-20 gratuitement?.....	10
16. Quel vaccin doit être administré aux jeunes sans risque particulier âgés de 1 à 4 ans et n'ayant jamais été vaccinés contre les IIP?	10
17. Quel vaccin doit être administré aux jeunes présentant une condition à risque élevé (voir question 7) âgés de 1 à 17 ans et n'ayant jamais été vaccinés contre les IIP?	10
18. Quel vaccin doit être administré aux jeunes présentant une condition à risque très élevé (voir question 8) âgés de 1 à 17 ans et n'ayant jamais été vaccinés contre les IIP?	11
19. Quoi faire lorsqu'un jeune âgé de 5 à 17 ans n'a pas reçu le nombre requis de dose prévu avant l'âge de 5 ans?	11
20. Quel vaccin Pneu-C doit être administré à un enfant ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques?.....	11
21. Est-ce qu'il est possible d'avoir un résumé des conduites à tenir pour la plupart des situations pour un jeune âgé de moins de 18 ans?	12
VACCINATION DES ADULTES	13
Programme de vaccination	13
22. Quels sont les changements au programme de vaccination contre le pneumocoque chez les adultes débutant le 3 novembre 2025?	13
23. Quelles clientèles adultes sont admissibles au programme gratuit de vaccination contre le pneumocoque et quels sont les vaccins utilisés pour chacune des clientèles?	14
Situations particulières	15
24. Est-ce qu'une dose de rappel est recommandée avec les nouveaux vaccins conjugués pour le pneumocoque?.....	15
25. Une personne adéquatement vaccinée avec le Pneu-P peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?.....	15
26. Une personne adéquatement vaccinée avec le Pneu-C-20 peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?.....	15
27. Une personne âgée de 70 ans ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 65 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?.....	15
28. Une personne âgée de 65 ans ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 55 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?.....	15
29. Une personne âgée de 65 ans ayant reçu un Pneu-C-20 à l'âge de 63 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?.....	15

-
30. Une personne âgée de 60 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 55 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement? 16
 31. Une personne âgée de 60 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 45 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement? 16
 32. Une personne âgée de 60 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP ayant reçu un Pneu-C-20 à l'âge de 57 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement? 16
 33. Une personne âgée de 18 ans et plus présentant une condition à risque très élevé d'IIP ayant déjà reçu un Pneu-C-20 peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement? 16
 34. Une personne âgée de 18 ans et plus présentant une condition à risque très élevé d'IIP ayant déjà reçu un Pneu-P peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-20 gratuitement? 16

PRÉSENTATION

Au Québec, un programme de vaccination contre les infections invasives à pneumocoque (IIP) est offert pour certaines clientèles vulnérables depuis 2002 et pour les enfants de moins de 5 ans depuis 2004. Ce programme a évolué au fil des années selon les différents avis du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), qui peuvent être consultés en ligne :

- [Stratégie de prévention des infections pneumococciques au Québec avec l'introduction des nouveaux vaccins conjugués \(2025\) ;](#)
- [Avis sur le choix d'un vaccin pneumococcique conjugué pour l'immunisation des enfants au Québec \(2023\) ;](#)
- [Avis concernant l'utilisation de nouveaux vaccins conjugués contre le pneumocoque \(2023\) ;](#)
- [Utilisation des vaccins conjugués contre les pneumocoques pour les patients immunodéprimés \(2022\) ;](#)
- [Avis sur le calendrier optimal de vaccination des enfants contre les infections à pneumocoque au Québec \(2017\) ;](#)
- [Avis sur l'utilisation des vaccins pneumococciques conjugués 13-valent \(VPC-13\) et polysaccharidiques \(VPP-23\) pour la prévention des infections invasives à pneumocoque et les pneumonies d'origine communautaire chez les personnes âgées de 65 ans et plus \(2017\).](#)

Le 3 novembre 2025, des modifications au programme de vaccination contre les IIP pour les adultes entreront en vigueur.

Ce document vise à répondre aux questions des vaccinateurs sur le programme de vaccination contre le pneumocoque et les situations particulières.

Le [Protocole d'immunisation du Québec](#) (PIQ) demeure la référence en matière de vaccination et devrait être consulté pour tout complément d'information. Le PIQ est consultable en ligne sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux.

GÉNÉRALITÉS

1. Quels sont les vaccins contre le pneumocoque disponibles au Québec?

Il existe 3 vaccins contre le pneumocoque disponibles au Québec protégeant contre divers sérogroupes.

		Vaxneuvance (Pneu-C-15)	Prevnar 20 (Pneu-C-20)	Capvaxive (Pneu-C-21)
Sérogroupes inclus dans les vaccins	1	X	X	
	3	X	X	X
	4	X	X	
	5	X	X	
	6A	X	X	X
	6B	X	X	
	7F	X	X	X
	8		X	X
	9N			X
	9V	X	X	
	10A		X	X
	11A		X	X
	12F		X	X
	14	X	X	
	15A			X
	15B		X	
	15C			X
	16F			X
	17F			X
	18C	X	X	
	19A	X	X	X
	19F	X	X	
	20A			X
	22F	X	X	X
	23A			X
	23B			X
	23F	X	X	
	24F			X
31			X	
33F	X	X	X	
35B			X	

2. Quels vaccins sont utilisés dans le cadre du Programme québécois d'immunisation (PQI)?

Les 3 vaccins disponibles au Québec sont utilisés dans le PQI. Leur utilisation dépend de l'âge, du milieu de vie, des niveaux de risque et des antécédents de vaccination. Pour connaître l'éligibilité de la personne à recevoir une dose de vaccin, référez-vous au PIQ à la section [Vaccins Pneu-C](#).

Si une dose de vaccin doit être administrée, le tableau suivant résume le vaccin à utiliser selon l'âge, le niveau de risque ou le milieu de vie.

Groupe d'âge	Sans facteur de risque	Risque élevé*	Risque <u>très</u> élevé*	Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James (peu importe le niveau de risque)
0 - 4 ans	Pneu-C-15	Pneu-C-15	Pneu-C-20	Pneu-C-20
5 - 17 ans	s.o.	Pneu-C-15	Pneu-C-20	Pneu-C-20
18 - 49 ans	s.o.	s.o.	Pneu-C-20	Pneu-C-20
50 - 64 ans	s.o.	Pneu-C-21	Pneu-C-20	Pneu-C-20
65 ans et plus	Pneu-C-21	Pneu-C-21	Pneu-C-20	Pneu-C-20

* Si une personne présente des conditions de niveaux différents, on utilisera le plus haut niveau de risque.

3. Quelles sont les intervalles à utiliser entre deux vaccins Pneu-C?

Les intervalles entre deux vaccins Pneu-C dépendent de l'âge d'administration du vaccin. Voici un tableau résumé des intervalles à utiliser entre deux Pneu-C.

Groupe d'âge	Intervalle entre deux Pneu-C	
	Recommandé	Minimal
2 – 11 mois	8 semaines	4 semaines
1 – 4 ans	8 semaines	8 semaines
5 ans et plus	1 an	s.o.

4. Quelle est la conduite à tenir si l'intervalle n'a pas été respecté entre deux vaccins Pneu-C?

Dans un contexte de gestion d'erreur, si un intervalle de 4 semaines ou plus a été respecté entre les vaccins Pneu-C, les doses sont considérées valides et n'ont pas à être redonnées. Si l'intervalle est de moins de 4 semaines, il faut redonner la dernière dose de Pneu-C en respectant l'intervalle minimal ou l'intervalle recommandé prévu initialement (voir [question 3](#)).

5. Quelle est la conduite à tenir si un intervalle de moins de 1 an a été utilisé entre un vaccin Pneu-P et un vaccin Pneu-C?

Dans un contexte de gestion d'erreur, si un intervalle de 4 semaines ou plus a été respecté entre les vaccins Pneu-P et Pneu-C, les doses sont considérées valides et n'ont pas à être redonnées. Si l'intervalle est de moins de 4 semaines, il faut redonner une dose de vaccin Pneu-C 1 an plus tard.

VACCINATION DES ENFANTS

Programme de vaccination

6. Quel est le calendrier régulier des enfants?

Le calendrier régulier des nourrissons utilise les vaccins suivants :

- Pneu-C-15 pour les enfants sans risque particulier et pour ceux présentant une condition à risque élevé (voir [question 7](#)).
- Pneu-C-20 pour les enfants présentant une condition à risque **très** élevé (voir [question 8](#)).
- Pneu-C-20 pour les enfants vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Voici un résumé du calendrier chez les nourrissons:

Âge	Précisions
2 mois	Âge minimal : 6 semaines
4 mois	Intervalle recommandé : 8 semaines
6 mois	Administer cette dose additionnelle aux nourrissons suivants : <ul style="list-style-type: none">• Prématurés (< 32 semaines) ou ayant un très faible poids à la naissance (< 1500 g)• Vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James• Présentant une condition à risque élevé ou très élevé (voir questions 7 et 8) Intervalle recommandé : 8 semaines Si cette dose a été omise à 6 mois, elle est indiquée jusqu'à l'âge de 11 mois.
1 an	Administer cette dose le jour du 1 ^{er} anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour, en respectant un intervalle minimal de 8 semaines depuis la dernière dose reçue.

7. Qui sont les jeunes âgés de moins de 18 ans présentant une condition à risque élevé?

Voici la liste des conditions à risque élevé :

- Maladie pulmonaire (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, emphysème, dysplasie bronchopulmonaire);
- Asthme accompagné d'une bronchite chronique, d'un emphysème ou d'une corticothérapie systémique de longue durée;
- Maladie cardiaque (ex. : insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, cardiopathie cyanogène);
- Maladie hépatique (ex. : porteur de l'hépatite B ou de l'hépatite C), sauf cirrhose;
- Diabète;
- Insuffisance rénale chronique, sauf insuffisance rénale terminale ou syndrome néphrotique;
- Condition médicale pouvant compromettre l'évacuation des sécrétions respiratoires et augmenter les risques d'aspiration (ex. : trouble cognitif, lésion médullaire, trouble convulsif, troubles neuromusculaires, trisomie 21);

8. Qui sont les jeunes âgés de moins de 18 ans présentant une condition à risque très élevé?

Voici la liste des conditions à risque très élevé :

- Asplénie (voir *Vaccinologie pratique*, [Asplénie anatomique ou fonctionnelle](#));
- États d'immunodépression (voir *Vaccinologie pratique*, [Immunodépression](#));
- Cirrhose;
- Implant cochléaire;
- Écoulement chronique de liquide céphalorachidien;
- Insuffisance rénale terminale (incluant les personnes dialysées) ou syndrome néphrotique.
- Dans des cas exceptionnels,
 - Itinérance (sans-abri);
 - Enfants chez qui l'on soupçonne l'administration de drogues dures par inhalation ou par injection avec une détérioration de l'état de santé ou des conditions de vie précaires.

9. Est-ce que le Pneu-P est utilisé chez les jeunes âgés de moins de 18 ans?

Non. Le vaccin Pneu-P ne doit pas être utilisé chez les jeunes âgés de moins de 18 ans.

10. Pourquoi les enfants à risque très élevé doivent-ils recevoir le vaccin Pneu-C-20 pour toute la série vaccinale de leur calendrier?

Le CIQ recommande d'utiliser le vaccin Pneu-C-20 chez les enfants à risque très élevé (voir [question 8](#)). Le but est de leur assurer la meilleure protection individuelle possible.

11. Que doit-on faire avec un jeune âgé de 2 à 59 mois qui a débuté sa vaccination avec un calendrier régulier utilisant un vaccin Pneu-C autre que le Pneu-C-15?

Un enfant ayant débuté un calendrier avec un vaccin Pneu-C-10, Pneu-C-13 ou Pneu-C-20 pourra poursuivre son calendrier en utilisant :

- le Pneu-C-15 pour les enfants sans facteur de risque ou pour ceux présentant une condition à risque élevé (voir [question 7](#));
- le Pneu-C-20 pour les enfants présentant une condition à risque très élevé (voir [question 8](#));
- le Pneu-C-20 pour les enfants vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

12. Un jeune âgé de moins de 18 ans sans risque particulier qui a déjà complété sa vaccination avec les vaccins Pneu-C-10 et Pneu-C-13 doit-il recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-15?

Non. Cet enfant est considéré comme adéquatement vacciné.

13. Un jeune âgé de moins de 18 ans présentant une condition à risque très élevé qui a déjà complété sa vaccination avec un vaccin Pneu-C autre que le Pneu-C-20 doit-il recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-20?

Oui. Un jeune âgé de moins de 18 ans présentant une condition à risque très élevé (voir [question 8](#)) doit recevoir au moins une dose de Pneu-C-20 en respectant l'intervalle selon l'âge (voir [question 3](#)), peu importe s'il a déjà reçu ou non un vaccin Pneu-P.

14. Un jeune âgé de moins de 18 ans présentant une condition à risque élevé qui a déjà complété sa vaccination avec un vaccin Pneu-C autre que le vaccin Pneu-C-15 ou Pneu-C-20 doit-il recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-15?

Non. Un enfant présentant une condition à risque élevé (voir [question 7](#)) est considéré comme adéquatement vacciné s'il a reçu le nombre requis de dose avant l'âge de 5 ans de Pneu-C (voir section [Calendriers de vaccination](#) selon l'âge du jeune au PIQ), peu importe s'il a déjà reçu ou non un vaccin Pneu-P.

Aucune dose additionnelle de Pneu-C-15 n'est recommandée pour cet enfant.

Situations particulières

Un tableau résumé des différentes conduites à tenir possible se trouve à la [question 21](#).

15. Un enfant qui est considéré comme adéquatement vacciné peut-il recevoir une dose de Pneu-C-15 ou Pneu-C-20 gratuitement?

Non. Un enfant qui est considéré comme adéquatement vacciné sans avoir une dose de Pneu-C-15 ou Pneu-C-20 ne peut pas la recevoir gratuitement. Un parent peut demander cette dose, mais elle ne sera pas gratuite.

16. Quel vaccin doit être administré aux jeunes sans risque particulier âgés de 1 à 4 ans et n'ayant jamais été vaccinés contre les IIP?

Les enfants âgés de 12 mois à 23 mois doivent recevoir 2 doses de Pneu-C-15 selon un intervalle minimal de 8 semaines entre les doses. Si la vaccination a été débutée avec un autre vaccin Pneu-C, poursuivre avec le Pneu-C-15 en conservant l'intervalle minimal de 8 semaines entre les doses.

Les enfants âgés de 2 à 4 ans doivent recevoir 1 dose de Pneu-C-15.

Prendre note que le Pneu-C-20 est utilisé au lieu du Pneu-C-15 chez les enfants vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Les enfants sans risque particulier âgés de 5 ans et plus n'ont pas besoin de dose de vaccin contre le pneumocoque, sauf si le parent le demande. Dans un tel cas, cette dose ne sera pas gratuite.

17. Quel vaccin doit être administré aux jeunes présentant une condition à risque élevé (voir [question 7](#)) âgés de 1 à 17 ans et n'ayant jamais été vaccinés contre les IIP?

Les enfants âgés de 1 an à 23 mois doivent recevoir 2 doses de Pneu-C-15 selon un intervalle minimal de 8 semaines entre les doses. Si la vaccination a été débutée avec un autre vaccin Pneu-C, poursuivre avec le Pneu-C-15 en respectant les intervalles (voir [question 3](#)).

Les enfants âgés de 2 à 17 ans doivent recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-15.

Prendre note que le Pneu-C-20 est utilisé au lieu du Pneu-C-15 chez les enfants vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

18. Quel vaccin doit être administré aux jeunes présentant une condition à risque très élevé (voir [question 8](#)) âgés de 1 à 17 ans et n'ayant jamais été vaccinés contre les IIP?

Les enfants âgés de 1 an à 23 mois doivent recevoir 2 doses de Pneu-C-20 selon un intervalle minimal de 8 semaines entre les doses. Si la vaccination a été débutée avec un autre vaccin Pneu-C, poursuivre avec le Pneu-C-20 en respectant les intervalles (voir [question 3](#)).

Les enfants âgés de 2 à 17 ans doivent recevoir 1 dose de vaccin Pneu-C-20.

19. Quoi faire lorsqu'un jeune âgé de 5 à 17 ans n'a pas reçu le nombre requis de dose prévu avant l'âge de 5 ans?

Voici un tableau résumé sur ce qui doit être fait selon le niveau de risque d'IIP du jeune lorsqu'il n'a pas reçu avant l'âge de 5 ans le nombre requis de doses d'un vaccin Pneu-C autre que le Pneu-C-20 selon le calendrier qui était en vigueur :

Niveau de risque d'IIP	Conduite à tenir	Intervalle
Risque très élevé (voir question 8)	Administrer 1 dose de Pneu-C-20	Respecter un intervalle de 1 an après la dernière dose reçue
Risque élevé (voir question 7)	Administrer 1 dose de Pneu-C-15*	Respecter un intervalle de 1 an après la dernière dose reçue
Sans risque particulier	Aucune dose	S.O.

* Prendre note que le Pneu-C-20 est utilisé au lieu du Pneu-C-15 chez les enfants vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

20. Quel vaccin Pneu-C doit être administré à un enfant ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques?

Peu importe le nombre de doses de vaccin Pneu-C reçues antérieurement, cet enfant doit recevoir une vaccination avec le Pneu-C selon le calendrier prescrit par le centre de greffes (voir dans le PIQ, *Vaccinologie pratique, Immunodépression*, [Greffes de cellules souches hématopoïétiques](#)).

21. Est-ce qu'il est possible d'avoir un résumé des conduites à tenir pour la plupart des situations pour un jeune âgé de moins de 18 ans?

Oui. Voici un tableau résumé sur les situations les plus courantes et les conduites à tenir selon les niveaux de risques :

Situations		Niveau de risque	Conduite à tenir
Calendrier Pneu-C non complété		Sans risque particulier	Enfants 2 à 59 mois : Poursuivre avec le Pneu-C-15 en respectant les intervalles (voir question 3)
			Enfants 5 ans ou plus : 0 dose
		Risque élevé	Enfants 2 à 59 mois : Poursuivre avec le Pneu-C-15 en respectant les intervalles (voir question 3)
			Enfants 5 ans ou plus : 1 dose de Pneu-C-15 en respectant l'intervalle (voir question 3)
		Risque très élevé	Enfants 2 à 59 mois : Poursuivre avec le Pneu-C-20 en respectant les intervalles (voir question 3)
			Enfants 5 ans ou plus : 1 dose de Pneu-C-20 en respectant l'intervalle (voir question 3)
Calendrier Pneu-C complété mais 0 dose de Pneu-C-20	Peu importe le nombre de dose de Pneu-P	Sans risque particulier	Considéré adéquatement vacciné
		Risque élevé	
		Risque très élevé	1 dose de Pneu-C-20 en respectant l'intervalle (voir question 3)
Calendrier Pneu-C complété avec au moins 1 dose de Pneu-C-20	Peu importe le nombre de dose de Pneu-P	Sans risque particulier	Considéré adéquatement vacciné
		Risque élevé	
		Risque très élevé	

Prendre note que le Pneu-C-20 est utilisé au lieu du Pneu-C-15 chez les enfants vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

VACCINATION DES ADULTES

Programme de vaccination

22. Quels sont les changements au programme de vaccination contre le pneumocoque chez les adultes débutant le 3 novembre 2025?

Le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque (Pneu-P) ne sera plus utilisé dans le cadre du Programme québécois d'immunisation (PQI). Il sera remplacé par le vaccin conjugué Pneu-C-21 pour les clientèles ciblées, sans effectuer de rattrapage.

Voici les différents changements :

- La vaccination chez les personnes âgées de 18 à 49 ans présentant une condition à risque élevé n'est plus recommandée ni gratuite, sauf pour celles vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James
- Les personnes âgées de 50 à 64 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP se verront offrir gratuitement le vaccin Pneu-C-21, sauf si elles ont déjà reçu :
 - une dose de Pneu-P à l'âge de 50 à 64 ans
 - OU
 - une dose de Pneu-C-20 ou de Pneu-C-21, peu importe l'âge d'administration
- Les personnes âgées de 65 ans et plus se verront offrir gratuitement le vaccin Pneu-C-21, sauf si elles ont déjà reçu :
 - une dose de Pneu-P à l'âge de 65 ans et plus
 - OU
 - une dose de Pneu-C-20 ou de Pneu-C-21, peu importe l'âge d'administration

Prendre note que le Pneu-C-20 demeure le produit utilisé chez les adultes vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

De plus, il n'y a pas de changement concernant la vaccination chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant une condition à risque **très** élevé, pour qui l'utilisation du vaccin Pneu-C-20 est maintenue.

Pour plus d'informations, référez-vous au PIQ à la section [Vaccins Pneu-C](#).

23. Quelles clientèles adultes sont admissibles au programme gratuit de vaccination contre le pneumocoque et quels sont les vaccins utilisés pour chacune des clientèles?

Voici un tableau qui résume les clientèles ciblées et le vaccin à utiliser selon l'âge et les conditions de santé ou de vie.

Clientèles adultes	Vaccins à utiliser
Personnes âgées de 18 ans et plus à risque très élevé : <ul style="list-style-type: none"> • Asplénie. • États d'immunodépression. • Cirrhose. • Implant cochléaire. • Écoulement chronique de liquide céphalorachidien. • Insuffisance rénale terminale (incluant les personnes dialysées) ou syndrome néphrotique. • Itinérance (sans abri). • Utilisation actuelle et régulière de drogues dures par inhalation ou par injection avec une détérioration de l'état de santé ou des conditions de vie précaires. 	Pneu-C-20
Personnes âgées de 50 ans et plus vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James	Pneu-C-20
Personnes âgées de 18 à 49 ans vivant dans les communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, et atteintes d'une condition à risque élevé (voir liste ci-dessous)	Pneu-C-20
Personnes âgées de 50 à 64 ans à risque élevé : <ul style="list-style-type: none"> • Maladie pulmonaire (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, emphysème, dysplasie bronchopulmonaire). • Asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers chez les personnes âgées de 50 ans et plus (chez les moins de 50 ans, l'asthme n'est pas une indication à moins qu'il ne soit accompagné d'une bronchite chronique, d'un emphysème ou d'une corticothérapie systémique de longue durée). • Maladie cardiaque (ex. : insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, cardiopathie cyanogène). • Maladie hépatique (ex. : alcoolisme, porteur de l'hépatite B ou de l'hépatite C), sauf cirrhose. • Diabète. • Insuffisance rénale chronique, sauf insuffisance rénale terminale ou syndrome néphrotique. • Condition médicale pouvant compromettre l'évacuation des sécrétions respiratoires et augmenter les risques d'aspiration (ex. : trouble cognitif, lésion médullaire, trouble convulsif, troubles neuromusculaires, trisomie 21). 	Pneu-C-21
Personnes âgées de 65 ans et plus	Pneu-C-21

Situations particulières

24. Est-ce qu'une dose de rappel est recommandée avec les nouveaux vaccins conjugués pour le pneumocoque?

Non. Aucune dose de rappel de Pneu-C-20 n'est requise pour une personne qui a déjà reçu un Pneu-C-20. La même conduite s'applique pour le Pneu-C-21.

25. Une personne adéquatement vaccinée avec le Pneu-P peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Une personne qui est considérée comme adéquatement vaccinée avec le Pneu-P ne peut pas recevoir de Pneu-C-21 gratuitement. Le Pneu-C-21 peut être administré aux personnes adéquatement vaccinées avec le Pneu-P, mais la vaccination ne sera pas gratuite.

26. Une personne adéquatement vaccinée avec le Pneu-C-20 peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Une personne qui est considérée comme adéquatement vaccinée avec le Pneu-C-20 ne peut pas recevoir de Pneu-C-21 gratuitement. Le Pneu-C-21 peut être administré aux personnes adéquatement vaccinées avec le Pneu-C-20, mais la vaccination ne sera pas gratuite.

27. Une personne âgée de 70 ans ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 65 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Cette personne est considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut tout de même choisir de recevoir le vaccin Pneu-C-21 pour bénéficier de la protection des sérotypes additionnels, mais la vaccination ne sera pas gratuite.

28. Une personne âgée de 65 ans ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 55 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Oui. Cette personne n'est pas considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut donc recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement.

29. Une personne âgée de 65 ans ayant reçu un Pneu-C-20 à l'âge de 63 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Cette personne est considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut tout de même choisir de recevoir le vaccin Pneu-C-21 pour bénéficier de la protection des sérotypes additionnels, mais la vaccination ne sera pas gratuite.

30. Une personne âgée de 60 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 55 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Cette personne est considérée comme adéquatement vaccinée jusqu'à l'âge de 64 ans. Elle se verra offrir une dose de Pneu-C-21 à l'âge de 65 ans.

31. Une personne âgée de 60 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP ayant reçu un Pneu-P à l'âge de 45 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Oui. Cette personne n'est pas considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut donc recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement.

32. Une personne âgée de 60 ans présentant une condition à risque élevé d'IIP ayant reçu un Pneu-C-20 à l'âge de 57 ans peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Cette personne est considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut toutefois se faire vacciner pour bénéficier de la protection des sérogroupes additionnels, mais la vaccination ne sera pas gratuite.

33. Une personne âgée de 18 ans et plus présentant une condition à risque très élevé d'IIP ayant déjà reçu un Pneu-C-20 peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-21 gratuitement?

Non. Cette personne est considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut tout de même choisir de recevoir le vaccin Pneu-C-21 pour bénéficier de la protection des sérogroupes additionnels, mais la vaccination ne sera pas gratuite.

34. Une personne âgée de 18 ans et plus présentant une condition à risque très élevé d'IIP ayant déjà reçu un Pneu-P peut-elle recevoir une dose de Pneu-C-20 gratuitement?

Oui. Cette personne n'est pas considérée comme adéquatement vaccinée. Elle peut donc recevoir une dose de Pneu-C-20 gratuitement en respectant l'intervalle de 1 an entre les doses.

