

PLAN DE DÉSINFECTION - Pour les préposés aux bénéficiaires

	SARM Bactérie multirésistante (1)	ERV Bactérie multirésistante (2)	C. DIFFICILE, CANDIDA AURIS	VIRUS RESPIRATOIRES INFLUENZA COVID-19	BMR (BGNMR/ BGNPC)	GASTRO-ENTÉRITE
Procédure de désinfection (petite désinfection)	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.	Jeter tout le matériel jetable et débiter la désinfection par les surfaces le plus fréquemment touché « High Touch » ex : lit, table de chevet, chaise et équipement mural.
Équipement de protection	Blouse, masque, gants*.	Blouse, gants*.	Blouse, gants*.	Blouse, masque, gants*.	Blouse, masque, gants*.	Blouse, gants*
Produits utilisés/ fréquence <i>*Vérifier la date de préparation du produit : Produit germicide et Eau de javel : <u>expire après 7 jours</u></i>	Lingettes d'ammonium quaternaire 1 fois	Lingettes d'ammonium quaternaire Procédure désinfection à faire 2 fois	3 opérations obligatoires : 1 ^{er} Produit germicide 2 ^e Rincer à l'eau tiède 3 ^e Solution d'eau javel	Lingettes d'ammonium quaternaire 1 fois	Lingettes d'ammonium quaternaire 1 fois	3 opérations obligatoires : 1 ^{er} Produit germicide 2 ^e Rincer à l'eau tiède 3 ^e Solution d'eau javel
Temps de contact <i>*Ne pas essuyer le produit, le laisser sécher.</i>	10 minutes	10 minutes	10 minutes pour lingettes d'ammonium quaternaire et 10 minutes pour la solution d'eau javel	10 minutes	10 minutes	10 minutes
Hygiène des mains <i>*En entrant et en sortant de la salle</i>	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon seulement. Le gel hydroalcoolique ne convient pas pour le « Clostridioïdes difficile »	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique
Isolement à cesser avec l'accord de l'infirmière en prévention des infections	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement

***Enlever les équipements de protection individuelle en commençant par les gants, la blouse et le masque (procéder à l'hygiène des mains entre chaque étape).**

Prévention et contrôle des infections en collaboration avec l'équipe d'hygiène et salubrité

Révision 2024-05-17

PLAN DE DÉSINFECTION – Hygiène et salubrité

	MRSA Bactérie multirésistante (1)	ERV Bactérie multirésistante (2)	C. DIFFICILE, CANDIDA AURIS	VIRUS RESPIRATOIRES INFLUENZA COVID-19	BMR (BGNMR/ BGNPC)	GASTRO-ENTÉRITE
Procédure de désinfection (grande désinfection)	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.	Débuter par le retrait des rideaux, vider et nettoyer les poubelles, laver les murs, la salle de bain et terminer par le plancher.
Équipement de protection	Blouse, masque, gants de nitrile*.	Blouse, gants de nitrile*.	Blouse, gants de nitrile*.	Blouse, masque, gants de nitrile*.	Blouse, masque, gants de nitrile*.	Blouse, gants nitrile*.
Produits utilisés/ fréquence <i>*Vérifier la date de préparation du produit : Produit germicide et eau de javel : expire après 7 jours</i>	Produit d'ammonium quaternaire 1 fois.	Produit d'ammonium quaternaire Procédure désinfection à faire 2 fois	3 opérations obligatoires : 1 ^{er} Produit germicide 2 ^e Rincer à l'eau tiède 3 ^e Solution d'eau javel	Produit d'ammonium quaternaire 1 fois.	Produit d'ammonium quaternaire 1 fois.	3 opérations obligatoires 1 ^{er} Produit germicide 2 ^e Rincer à l'eau tiède 3 ^e Solution d'eau javel
Temps de contact <i>*Ne pas essuyer le produit, le laisser sécher.</i>	10 minutes	10 minutes	10 minutes pour l'ammonium quaternaire et 10 minutes pour la solution d'eau javel	10 minutes	10 minutes	10 minutes
Hygiène des mains <i>*En entrant et en sortant de la salle</i>	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon seulement. <i>Le gel hydroalcoolique ne convient pas pour le « Clostridioides difficile »</i>	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique
Isolement à cesser avec l'accord de l'infirmière en Prévention des infections	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement

*** Enlever les équipements de protection individuelle en commençant par les gants, la blouse et le masque (procéder à l'hygiène des mains entre chaque étape).**