

# PRÉCAUTION CONTACT



1

Procéder à l'hygiène des mains avec eau et savon




2

Porter des gants avant d'entrer dans la chambre



3

Porter une blouse avant d'entrer dans la chambre



4

Porter les couvre-chaussures dans la chambre

# Gale

La gale est une éruption de la peau causée par un acarien parasite (le Sarcop-tes). La gale est très contagieuse. La transmission se fait surtout de personne à personne. Elle peut aussi se faire par le biais des vêtements ou de la literie. La période d'incubation est de 4 à 6 semaines entre le moment de contact et le début des symptômes. La personne cesse d'être contagieuse 48 heures après le traitement antiparasitaire.

## Comment détecter la présence de la gale

- ▶ Démangeaison généralisée aggravée à la chaleur;
- ▶ Lésions linéaires blanchâtre (sillons). Ce sillon apparaît le plus souvent entre les doigts, dans les plis des poignets, des coudes ou des aisselles, sur les organes génitaux et les seins;
- ▶ Éruptions d'allure allergique avec des papules érythémateuses qui progressent;
- ▶ Lésions de grattage.

## Consignes à suivre

- ▶ Isolement «Précautions contact»;
- ▶ Demander au patient de mettre une jaquette et des gants s'il est au triage à l'urgence et l'installer dans une salle d'examen;
- ▶ Informer le patient et déposer tous ses effets personnels (vêtements, manteau, valise, sac à dos, sac à mains, livre, etc.) dans des sacs hermétiquement fermés, doublés et identifiés au nom du patient, date et département.
- ▶ Aviser le service d'hygiène et salubrité pour déposer en quarantaine les effets personnels du patient au congélateur au local S-1950-1 (carte passe-partout des coordonnateurs obligatoire).
  - Du lundi au vendredi, quart de jour et quart de soir : poste 3356.
  - Du samedi au dimanche et jour fériés, quart de jour et quart de soir : poste 6789.
  - Entre minuit et 6 h 30, communiquer avec le coordonnateur de nuit : poste 3456.
- ▶ Transférer le patient en jaquette (sans les effets personnels) sur une civière (urgence) ou une autre chambre le plus rapidement possible.
- ▶ Si isolement cessé, aviser le service d'hygiène-salubrité (numéro de poste mentionné ci-haut) pour procéder au nettoyage (l'aspirateur et germicide) de la chambre ou du local touché (procédure faite de jour et de soir).
- ▶ Garder la porte de la chambre fermée.
- ▶ L'assistant de l'unité communique avec le service d'hygiène et salubrité pour récupérer les effets personnels du patient après 48 heures.