



## Ciprofloxacin (Cipro<sup>MC</sup>), Moxifloxacin (Avelox<sup>MC</sup>)

**CLASSE :**  
**Quinolone**

### Effets

- ◆ Détruit les bactéries causant une infection.

### Indications

- ◆ Traitement de plusieurs types d'infections causées par diverses bactéries.

### Mode d'administration

- ◆ Prendre à intervalles réguliers durant la journée, avec ou sans nourriture.
- ◆ À moins d'avis contraire de votre médecin, boire beaucoup d'eau durant la journée.
- ◆ Il est très important de prendre toute la quantité prescrite, même si vous vous sentez mieux.
- ◆ Évitez la prise d'antiacides avec ce médicament (ex : Maalox, Gaviscon, Roloids), car ils empêchent le médicament d'agir. Consultez votre pharmacien à ce sujet pour plus d'information.
- ◆ Espacer la prise de produits laitiers, de suppléments de calcium ou de multivitamines de 4 heures avant ainsi que 4 heures après la prise de votre antibiotique.

## Ciprofloxacin (Cipro<sup>MC</sup>), Moxifloxacin (Avelox<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Nausées.
- ◆ Malaises à l'estomac.
- ◆ Diarrhée (consultez votre pharmacien si persiste).
- ◆ Peut rendre votre peau plus sensible au soleil (utiliser un écran solaire adéquat FPS30 et plus).

### Précautions

- ◆ Si vous faites encore de la fièvre après 2 à 3 jours de traitement, consultez votre médecin. L'antibiotique n'est peut-être pas efficace.
- ◆ Si l'infection n'est pas complètement disparue à la fin du traitement, consultez votre médecin.
- ◆ Ce médicament peut augmenter ou diminuer l'effet de plusieurs autres, même ceux vendus sans prescription. N'hésitez pas à consulter votre pharmacien.

### Notes

---

---

---

---

---