



Rifampicine (Rifampin ^{MC})

CLASSE :

Antibiotique antituberculeux

Effets

- ◆ Détruit les bactéries causant une infection.

Indications

- ◆ Traitement de certains types d'infection causée par diverses bactéries.

Mode d'administration

- ◆ Pour une meilleure efficacité, prendre à jeun (1 heure avant le repas ou 2 heures après le repas) avec un grand verre d'eau.
- ◆ Si le médicament vous cause des maux d'estomac, le médecin peut vous recommander de le prendre avec de la nourriture.
- ◆ Prendre ce médicament pendant toute la durée du traitement.
- ◆ Si vous oubliez une dose, prenez-la le plus tôt possible mais ne doublez pas la dose suivante.

Rifampicine (Rifampin ^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Maux d'estomac, diarrhée.
- ◆ Rarement : nausées, vomissements.
- ◆ Consultez votre médecin si vous notez une coloration jaune de la peau et des yeux, un mal de gorge inexplicable, de la faiblesse ou si vous avez des nausées, vomissements persistants ou une perte d'appétit.
- ◆ Ce médicament peut colorer en rouge orangé l'urine, les selles, la salive, la sueur et les larmes. C'est un effet normal causé par ce médicament.

Précautions

- ◆ Avisez votre médecin si vous souffrez de problèmes hépatiques (du foie) ou si vous consommez régulièrement de l'alcool.
- ◆ Ne pas porter de lentilles cornéennes, car ce médicament peut les colorer en rouge de façon permanente.
- ◆ Si vous ne connaissez pas votre réaction à ce médicament ou que vous n'en avez jamais pris, soyez prudent si vous devez conduire une voiture ou faire des activités nécessitant toute votre attention.
- ◆ Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, car la Rifampicine peut interagir avec plusieurs médicaments.

Notes
