

Compatibilités en Y de médicaments IV intermittents et les perfusions courantes

Pour la concentration des médicaments surlignés Se référer aux tableaux de dilution	Dextrose 5 % (dérivé)	Lactate Ringer (dérivé)	NaCl 0,9% (dérivé)	Amiodarone (Cordarone ^{MD}) PERFUSION	Amiodarone (Cordarone ^{MD}) BOLUS 150 à 300 mg dans NS	Cefazoline 1 ou 2 g dans ESI	Digoxin ad 0,5 mg dans NS	Fentanyl BOLUS 50 mcg/mL non dilué	Furosémide (Lasix ^{MD}) PERFUSION 2, 9 mg/mL (400 mg/140 mL) NS	Furosémide (Lasix ^{MD}) BOLUS Toutes dilutions dans NS	Halopéridol (Haldol ^{MD}) 0,5 et 1 mg dans NS	Héparine (25000 Unités/250 mL) 100 Unités/mL D5%	Hydrocortisone ad 250 mg dans NS	Métoclopramide 10 mg dans NS	Milrinone (Primacor ^{MD}) 167 mcg/mL (20 mg/120 mL) NS	Nitroglycérine (50 mg/250 mL) 200 mcg/mL D5% bouteille	Odansétron 4 mg dans NS	Pantoprazole (Pantoloc ^{MD}) 0,8 mg/mL (80 mg/100 mL) NS	Pipéracillin/tazobactam	Potassium chlorure Toute préparation par la	Procainamide (Pronesty ^{MD}) Ad 20 mg/mL (1000mg/ 60mL) NS	Vancomycine Toutes dilutions dans NS
	Amiodarone Perfusion	C		C				I	C	I	I	C	I	I			C		I	I		
Amiodarone Bolus	C		C				I		I	I		I	I									C
Cefazoline	C	C	C				C		C		I	C	C	C			C				C	
Digoxin	C	C	C	I	I	C			C		I	C	C	C		C					C	C
Fentanyl	C		C	C						C		C							I			
Furosémide Perfusion	C	C	C	I	I	C	C				I	C	C	C	I	I	I				C	I
Furosémide Bolus	C	C	C	I	I			C			I	C			I	I	I					I
Halopéridol	C	I	C	C		I	I		I	I				V			V	I	I	I	I	I
Héparine	C	C	C	I	I	C	C	C	C	C	I		C	C	C	C	C				C	C
Hydrocortisone	C	C	C	I	I	C	C		C		I	C		C			C				C	V
Métoclopramide	C	C	C			C	C		C		V	C	C				C				C	C
Milrinone	C	C	C						I	I		C					I	I				
Nitroglycérine	C			C					I	I		C										
Odansétron	C	C	C			C	C		I	I	V	C	C	C	I			I			C	C
Pantoprazole	C	C	C	I				I			I				I							
Pipéracillin/tazobactam	C	V	C	I							I											
Potassium chlorure	C	C	C			C	C		C		I	C	C	C			C				C	C
Procainamide	V	C	C									C		C			C				C	
Vancomycine	C	C	C		C		C		I	I	I	I	V	C		C					C	

Légende

C Compatible

I Incompatible

V Variable (voir verso)

Non testé

Département de pharmacie
Révisé : MARS 2017

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES COMPATIBILITÉS VARIABLES

→ Attention : toutes ces combinaisons ont déjà été démontrées INCOMPATIBLES dans certaines circonstances

Halopéridol/Métoclopramide :	Incompatibles aux dilutions indiquées. Seraient compatibles si les 2 médicaments étaient dilués avec du D5%
Halopéridol/Odansétron :	Incompatibles aux dilutions indiquées. Seraient compatibles si les 2 médicaments étaient dilués avec du D5%
Hydrocortisone/Vancomycine :	Incompatibles aux dilutions indiquées. Seraient compatibles si les 2 médicaments étaient dilués avec du D5%
Pipéracillin-tazobactame/Lactate Ringer :	Variable selon la compagnie. Compatible si Sandoz. Vérifier avec le pharmacien la compagnie utilisée si seringue déjà préparée par la pharmacie
Procainamide/Dextrose 5% :	Instabilité chimique (non visible) qui entraîne une perte d'environ 15% de procainamide en 4h