

PLAN DE DÉSINFECTION SALLE D'OPÉRATION/SALLE HYBRIDE – Hygiène et salubrité

Bactérie multirésistantes	SARM Bactérie multirésistante (1)	ERV Bactérie multirésistante (2)	CLOSTRIDIODES DIFFICILE CANDIDA AURIS	VIRUS RESPIRATOIRES INFLUENZA COVID-19	BMR (BGNMR/ BGNPC)	GASTRO-ENTÉRITE
Mode de transmission	Contact + gouttelettes	Contact	Contact	Contact + gouttelettes	Contact + gouttelettes	Contact + gouttelettes
Équipement de protection	Blouse, masque, gants*.	Blouse, gants*.	Blouse, gants*.	Blouse, masque, gants*.	Blouse, masque, gants*.	Blouse, gants*
Produits utilisés et fréquence	Produit ammonium quaternaire 1 fois	Produit ammonium quaternaire Procédure désinfection à faire 2 fois.	3 opérations sont nécessaires 1 ^{er} Ammonium quaternaire 2 ^e Rincer à l'eau tiède 3 ^e Solution d'eau javel	Produit ammonium quaternaire 1 fois	Produit ammonium quaternaire 1 fois	Produit ammonium quaternaire 1 fois
Temps de contact * Ne pas essuyer le produit, le laisser sécher. Écran, essuyé immédiatement	10 minutes	10 minutes.	10 minutes pour chaque produit désinfectant	10 minutes	10 minutes	10 minutes
Hygiène des mains en entrant et en sortant de la salle	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique.	Eau et savon seulement. Le gel hydroalcoolique ne convient pas pour le « Clostridioides difficile »	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique	Eau et savon ou gel hydroalcoolique
Procédure de désinfection entre les cas *Enlever l'affiche d'isolement après la désinfection de la salle Lundi au vendredi 8h30- 23h30 Garde nuit et FDS 00h00 à 8h00	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sortir les déchets <input type="checkbox"/> Retirer la lingerie souillée <input type="checkbox"/> Sortir ou jeter le matériel jetable <input type="checkbox"/> Enlever toutes souillures sur le plancher et les murs <input type="checkbox"/> Laver le plancher en partant du milieu <input type="checkbox"/> Nettoyer et désinfecter les surfaces le plus fréquemment touchées <p>*Ne jamais rentrer le chariot d'entretien ménager exclusif de la zone stérile dans la salle d'isolement. *Utiliser une petite table pour déposer le matériel d'entretien ménager.</p>					
Procédure de désinfection en fin de journée *Enlever l'affiche d'isolement après la désinfection de la salle	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vider et nettoyer les poubelles <input type="checkbox"/> Recueillir et retirer la lingerie souillée. <input type="checkbox"/> Enlever toutes souillures sur le plancher et les murs. <input type="checkbox"/> Laver le plancher en partant du milieu <input type="checkbox"/> Nettoyer et désinfecter les surfaces en hauteur. <input type="checkbox"/> Nettoyer et désinfecter les surfaces le plus fréquemment touchées <input type="checkbox"/> Terminer par le plancher. 					

*** Enlever les équipements de protection individuelle en commençant par les gants, la blouse et le masque (procéder à l'hygiène des mains entre chaque étape).**

Prévention et contrôle des infections avec la collaboration d'hygiène et salubrité et la salle d'opération.

Révision 2024-06-04



RAPPEL DES PROCÉDURES EN SALLE OPÉRATION LORS DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (ISOLEMENT)

- **Il est préférable de céduer le patient en fin de journée (2^{ième} cas)**
- **Aviser le service ou l'unité avant de déplacer le patient**
- **Lors du déplacement, couvrir le patient d'un drap propre et appliquer le masque de procédure au patient selon l'affiche**
- **Avoir un équipement de protection individuel (EPI) propre lors du déplacement de patient**
- **Appliquer l'hygiène des mains lors de ces moments :**
 - **Avant d'enfiler l'EPI**
 - **Après le retrait des gants**
 - **Avant le retrait du masque**
 - **Après le retrait du masque**
 - **Avant de prendre du matériel dans une armoire ou un tiroir**
 - **À la sortie de la chambre du patient**
- **Changer lorsque souillés, le bonnet et les couvre-chaussures entre les cas**
- **Retirer le bonnet, le masque et les couvre-chaussures à la sortie du bloc opératoire**
- **Patient provient d'une UNITÉ en ÉCLOSION à l'ICM et pas en isolement:**
 - **Dépistage PCR doit être fait au transfert du patient sur l'unité en éclosion**
 - **Appliquer les précautions additionnelles seulement si résultat positif au PCR et les patients en contact étroit**
 - **En tout temps, le patient sera en isolement (contact élargie) lors de son admission aux soins intensifs**
 - **Seule la prévention des infections autorisera la fin de l'isolement**

*** Enlever les équipements de protection individuelle en commençant par les gants, la blouse et le masque (procéder à l'hygiène des mains entre chaque étape).**

Prévention et contrôle des infections avec la collaboration d'hygiène et salubrité et la salle d'opération.

Révision 2024-06-04

