

# Tableau synthèse de la surveillance des bactéries, virus, levures multirésistantes et *Clostridioides difficile*

Seule l'infirmière en PCI autorisera la fin de l'isolement pour les résultats positifs/ présomptifs, les contacts étroits et le *Clostridioides difficile*

## Recommandations

- Éviter de déplacer les patients vers d'autres unités de soins afin d'éviter la transmission des bactéries multirésistantes (BMR), virus et levures multirésistantes;
- Éviter de déplacer les patients sur une même unité;
- Regrouper les patients positifs sur l'unité (ex: section rouge, orange, verte);
- Lors d'éclosion d'une unité, le patient qui nécessite un transfert d'unité doit être dépisté et isolé dans sa nouvelle unité de soins en attendant le résultat du dépistage;
- Lors d'un transfert de patient sur un autre étage, faire un dépistage ERV PCR et BMR PCR;
- Sous aucun prétexte un patient porteur ERV ne doit être jumelé avec un patient porteur SARM;
- Aviser les patients qui circulent de ne pas se promener sur d'autres unités de soins;
- Aviser les assistants (tes) des résultats positifs du patient lors de transferts vers d'autres services/unités à l'ICM et vers d'autres centres hospitaliers, centres de réadaptation ou centres de convalescence;
- En présence de symptômes respiratoires et en l'absence de diagnostic différentiel, appliquer un masque de procédure;
- **EN CAS DE DOUTE, APPLIQUER UN ISOLEMENT.**

Bactérie multirésistantes	SARM	ERV	BMR (BGNPC) (bactérie gram négatif productrice de carbapénémase)	BMR (BGNMR) (autre bactérie gram négatif développant des résistances aux antibiotiques)	<i>Candida auris</i>	<i>Clostridioides Difficile</i>	Influenza Virus respiratoires autre que la COVID-19	COVID-19	Gastro- entérite d'allure virale
Mode de transmission	Contact	Contact	Contact gouttelettes	Contact gouttelettes	Contact	Contact	Contact gouttelettes	Contact gouttelettes *Si IMGA: aérien	Contact
Précautions additionnelles	Gants Jaquette Masque  <b>Visiteurs</b> <b>Masque non requis</b>	Gants Jaquette	Gants Jaquette Masque	Gants Jaquette Masque	Gants Jaquette	Gants Jaquette	Gants Jaquette Masque de procédure <b>Si procédure générant des aérosols : masque N-95</b>	Gants Jaquette Masque de procédure <b>Si procédure générant des aérosols : masque N-95</b>	Gants Jaquette  Si présence de vomissement/ d'éclaboussures, porter un masque et la protection oculaire
Contrôle de la transmission  <b>Également, se référer aux documents suivants : Algorithme contrôle de la transmission des BMR et Avis sur l'éclosion du ERV et autres BMR</b>	Faire un dépistage SARM pour tous les patients admis  Isoler le patient connu SARM	Faire un dépistage ERV pour tous les patients ayant séjourné > 24h ou transféré directement d'un centre hospitalier, centre d'accueil, réadaptation, convalescence  Isoler le patient connu ERV	Faire un dépistage <b>BMR anus</b> pour tous les patients ayant séjourné >24 dans un centre hospitalier en éclosion et pour tous les patients ayant séjourné > 24h dans un centre hospitalier hors Canada Isoler le patient connu BGNPC	Isoler le patient lorsque le laboratoire de microbiologie découvre une de ces bactéries dans un spécimen clinique  Isoler le patient connu BMR (BGNMR)	Isoler le patient et faire un dépistage CCAUR pour tous les patients ayant voyagé hors Québec dans la dernière année ou arrivant d'une unité en éclosion d'un établissement au Québec  Isoler le patient lorsque le laboratoire de microbiologie découvre la levure et Isoler le patient connu <i>Candida auris</i>	Isoler tous les patients ayant eu trois selles liquides dans les 24 h	Isoler tous les patients ayant des symptômes d'allure grippale	Isoler tous les patients ayant des symptômes d'allure grippale	Isoler tous les patients ayant des symptômes gastro-intestinaux soudains (diarrhée et/ou vomissement avec fièvre, douleur abdominale, nausée, céphalées) au cours d'une période de 24h

Bactérie multirésistantes	SARM	ERV	BMR (BGNPC) (bactérie gram négatif productrice de carbapénèmase)	BMR (BGNMR) (autre bactérie gram négatif développant des résistances aux antibiotiques)	Candida auris	Clostridium Difficile	Influenza Virus respiratoires autre que la COVID-19	COVID-19	Gastro- Entérite
<b>Patient ayant partagé la même chambre qu'un porteur positif ou présomption</b>	Isoler et tester tous les patients excédant ou égale à 24H et faire un dépistage SARM PCR. Si résultat négatif, cesser l'isolement	<b>Isoler le patient, faire un dépistage ERV PCR.</b> <u>Si résultat positif</u> : garder le patient dans la même chambre que le porteur positif. <u>Si résultat négatif</u> : changer le patient de chambre (contact étroit)	Isoler le patient Faire un dépistage BMR (BGNPC) PCR <u>Si résultat positif</u> : garder le patient dans la même chambre que le porteur positif. <u>Si résultat négatif</u> : changer le patient de chambre (contact étroit)	Isoler le patient (contact étroit)  Dépistage du site selon l'avis de l'infirmière en PCI	Isoler le patient (contact étroit) Et Faire les dépistages Aines Aisselles Nez	Isoler uniquement si le patient présente des selles liquides	Isoler le patient x 72h ou selon la période d'incubation du virus émis par la PCI et offrir vaccin s'il y a lieu	Isoler le patient x 4 jours (admission = jour 0)	Isoler le patient x 72h
<b>Isolement à cesser avec l'accord de l'infirmière en prévention des infections</b>	<u>SARM +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>SARM préventif</u> : Pas de désinfection	<u>ERV +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>ERV préventif</u> : Pas de désinfection	<u>BMR +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>BMR préventif</u> : Pas de désinfection	<u>BMR +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>BMR préventif</u> : Pas de désinfection	<u>Candida auris +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>Candida auris préventif</u> : Pas de désinfection	<u>Toujours</u> désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement	<u>Si cas +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>Si cas préventif</u> : Pas de désinfection	<u>Si cas +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>Si cas préventif</u> : Pas de désinfection	<u>Si cas +</u> ou <u>contact étroit</u> : Désinfecter la chambre par l'équipe de salubrité avant de cesser isolement  <u>Si cas préventif</u> : Pas de désinfection

Bactérie multirésistantes	SARM	ERV	BMR (BGNPC) (bactérie gram négatif productrice de carbapénèmase)	BMR (BGNMR) (autre bactérie gram négatif développant des résistances aux antibiotiques)	Candida auris	Clostridium Difficile	Influenza Virus respiratoires autre que la COVID-19	COVID-19	Gastro- Entérite
<b>Conduite réservée en PCI</b>	<p><b>Nouveau SARM durant l'hospitalisation</b> Isoler le patient et Deux mois suivant le dernier dépistage positif, trois dépistages négatifs de tous les sites positifs à une semaine d'intervalle.</p> <p><b>Connu SARM et réadmis</b> Isoler le patient. Deux dépistages de tous les sites positifs à un intervalle de 48h.</p> <p>Les prélèvements doivent être effectués alors que le patient n'a pas reçu de traitement par antibiotique systémique ou topique(Mupirocin) dans les 7 jours.</p>	<p><b>Positif</b> Isoler le patient et Trois mois suivant le dernier dépistage positif, trois dépistages négatifs de tous les sites positifs à une semaine d'intervalle.</p> <p><b>Contact étroit</b> Isoler le patient Trois dépistages négatifs à une semaine d'intervalle (J0, J7 et J14).</p> <p><b>Préventif</b> Isoler le patient Résultat négatif à l'admission : cesser l'isolement.</p>	<p><b>BGNPC Positif</b> Isoler toute la durée de l'hospitalisation. et Trois mois suivant le dernier dépistage positif, trois dépistages négatifs de tous les sites positifs à une semaine d'intervalle.</p> <p><b>Contact étroit</b> Isoler le patient Trois dépistages négatifs à une semaine d'intervalle (J0, J7 et J14).</p> <p><b>Connu BGNPC et réadmis</b> Cesser l'isolement avec l'accord du microbiologiste.</p>	<p><b>BGNMR Positif</b> Isoler le patient jusqu'à un total de trois dépistages négatifs à une semaine d'intervalle de tous les sites positifs.</p> <p><b>Préventif</b> Isoler le patient Résultat négatif à l'admission : cesser isolement.</p> <p><b>Contact étroit</b> Cesser l'isolement avec l'accord de la PCI.</p>	<p><b>Positif</b> Isoler le patient toute la durée de l'hospitalisation et trois mois suivant le dernier résultat positif, trois dépistages de tous les sites positifs à une semaine d'intervalles.</p> <p><b>Contact étroit</b> *Contact significatif 4 h</p> <p>Isoler le patient et procéder à 3 dépistages négatifs à une semaine d'intervalle (J0, J7 et J14). (12 mois et moins)</p> <p><b>Contact élargi (unité en vigie/éclosion)</b> Isoler le patient et procéder à 3 dépistages négatifs à une semaine d'intervalle (J0, J7 et J14). (12 mois et moins) Les prélèvements doivent être effectués alors que le patient n'a pas reçu de traitement antifongique depuis au moins une semaine et attendre 48h avant de faire un prélèvement à un site qui a été désinfecté avec un antiseptique topique (ex : Chlorhexidine)</p>	<p><b>Positif</b> Patient demeure isoler jusqu'à l'obtention de selle normale pendant 72 heures et pas d'antibiotique en cours, leucocyte à la baisse et stable, pas de douleur abdominale.</p> <p><b>Préventif</b> Patient demeure en isolement jusqu'à la cessation de selle liquide pendant 48h à 72h et pas d'antibiotique en cours, leucocytes à la baisse et stable, pas de douleur abdominale.</p>	<p><b>Positif</b> Isoler minimalement 7 jours selon la période de contagiosité et jusqu'à cessation de symptômes d'allure grippale.</p> <p>*Valider avec un test PCR selon la PCI</p> <p><b>Contact étroit asymptomatique</b> Isoler x 72H ou selon la période d'incubation du virus émis par la PCI</p> <p>Si pas symptômes d'allure grippale cesser isolement</p> <p>Les personnes immunodéprimées peuvent excréter les virus plus longtemps</p> <p>* Contact significatif est ≥ 4 h</p>	<p><b>Positif</b> Isoler x 10 jours et jusqu'à cessation de symptôme d'allure grippale.</p> <p>*Valider avec un test PCR selon la PCI</p> <p>Immunodéprimé: Isoler x 21 jours. Les personnes immunodéprimées peuvent excréter les virus plus longtemps</p> <p><b>Contact étroit asymptomatique</b> Isoler x 4 jours (admission = jour0)</p> <p>Si pas symptômes d'allure grippale cesser isolement</p> <p>*Valider avec un test PCR</p> <p>* Contact significatif est ≥ 10 minutes</p> <p><b>Contact élargi (unité en vigie/éclosion)</b> Aucun isolement Répéter un dépistage Jour4 (admission = jour0)</p>	<p><b>Positif</b> Cesser isolement jusqu'à 48 h suivant la fin des symptômes.</p> <p><b>Contact étroit asymptomatique</b> Isoler x 72H Si pas symptômes cesser isolement.</p> <p><b>Contact élargi asymptomatique</b> Isoler x 72H Si pas symptômes cesser isolement.</p>