Tableau synthèse des types de précautions

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

	Contact	Contact ⊕	Contact et gouttelettes	Contact et gouttelettes ⊕	Contact, aérien	Aérien
Transport	• Toujours aviser le service receveur de l'isolement avant le départ du patient • Minimiser le temps passé dans les aires communes • Changer la jaquette d'hôpital du patient pour en mettre une propre et appliquer l'hygiène des mains du patient • Si le patient est en fauteuil roulant : couvrir le fauteuil roulant d'une couverture/drap propre et faire porter l'ÉPI au patient • Si le patient est en civière/lit : couvrir lit/civière/ridelles ainsi que le patient jusqu'aux épaules avec une couverture/drap propre (laisser la tête dégagée), le personnel de soins doit aussi revêtir une jaquette d'isolement, en plus des autres ÉPI indiqués sur l'affiche • Après utilisation, désinfecter le fauteuil roulant ou la civière en fonction des directives affichées sur la pancarte d'isolement • Sorties de chambre permises pour assurer le maintien de la mobilité, après consultation de la PCI					
Chambre et porte	• Chambre individuelle • Porte fermée ou semi-ouverte (maintenir l'affiche d'isolement visible)				• Chambre individuelle • Pression négative avec SAS • Porte fermée en tout temps	
Matériel médical	• Réservé à l'usage exclusif du patient • Désinfection du matériel selon l'affiche si équipement doit sortir de la chambre					
Examen					• Privilégier les examens dans la chambre (radiographie, bronchoscopie, etc.)	
Laboratoire					• **Informer** le laboratoire avant d'apporter un échantillon si SRAS, MRSI, grippe aviaire ou nouvelle maladie émergente • Décontaminer avec une lingette désinfectante les écouvillons/ tubes/ pots • Placer l'échantillon dans un **sac Biorisque** • Transport de l'échantillon uniquement par le **PAB** • Ne pas envoyer par pneumatique	

Tableau synthèse des types d'isolement

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

	Contact	Contact ⊕	Contact et gouttelettes	Contact et gouttelettes ⊕	Contact, aérien	Aérien
Pathogènes	• ERV • Zona localisé **(patient immunocompétent)** • Herpès disséminé	• Gastroentérite • *Candida auris* • *Clostridioides difficile*	• SARM • BMR* (BGNMR et BGNPC)	• Virus respiratoires communs** **sans IMGA ni instabilité hémodynamique ou respiratoire** • Conjonctivite • Streptocoque A*** • Coqueluche • Oreillons • Méningite • Rubéole	• Virus respiratoires communs** **patients instables** • SRAS • MRSI • Zona disséminé • Zona localisé (patient immunodéprimé) • Rougeole • Varicelle • Variole simienne • Grippe aviaire • Nouvelle maladie émergente	• Tuberculose
Notes spéciales	• **Double désinfection** de la chambre et des équipements • **Durée des précautions** pour Zona et Herpès : jusqu'à ce que les lésions soient sèches et recouvertes d'une croûte • Couvrir les lésions avec un pansement jusqu'à la fin de l'écoulement	• Désinfection de la chambre et des équipements en **3 étapes** • *C. Difficile* : hygiène des mains à l'**eau et au savon obligatoire** • ***Candida auris*** **:** Privilégier les examens dans la chambre		• Pour rubéole, **seul le personnel immunisé** (vacciné ou ayant déjà eu la maladie) peut entrer dans la chambre	• Pour rougeole, varicelle et zona → **seul le personnel immunisé** (vacciné ou ayant déjà eu la maladie) peut entrer dans la chambre • Pour la variole simienne, faire la désinfection en 3 étapes : 1. Ammonium quaternaire (temps de contact 10 minutes) 2. Eau tiède 3. Eau Javel	**Visiteurs vivant sous le même toit :** • Port du masque de procédure dans la chambre • Éviter les lieux publics • Changer le masque après la visite **Autres visiteurs :** • Limiter au strict minimum • Un visiteur à la fois • Port du N-95 • Informer du risque de transmission

* BGNMR (bacilles Gram négatif multirésistants) et BGNPC (bacilles à Gram négatif producteurs de carbapénémases)
**Influenza, Covid-19, VRS, parainfluenza, métapneumovirus, rhinovirus, entérovirus, autres
***Maladie invasive (syndrome semblable au choc toxique/ bactériémie/ pneumonie) et infection cutanée étendue (ex. : fasciite nécrosante)